



ATTENTION

Risque de confusion entre les flacons...

du vaccin **COMIRNATY**
(Pfizer BioNTech)

et de solvant
(Chlorure de sodium)



Des erreurs ayant conduit à l'administration de solvant seul (Chlorure de sodium) à la place du vaccin Comirnaty dilué, ont été remontées à l'ANSM.

Pour prévenir ce risque

- ◆ Identifier et différencier les 2 flacons avant toute administration
- ◆ Séparer les flacons de solvants et les flacons de vaccin
- ◆ Dans la mesure du possible, reconstituer le flacon au dernier moment

En cas de dilution des flacons à l'avance

- ◆ Entreposer à 2 endroits différents les flacons dilués et les flacons non dilués
- ◆ Noter la date et l'heure d'expiration sur le flacon dilué
- ◆ En cas de changement d'équipe, bien préciser si les flacons sont déjà reconstitués



RAPPELS : RECONSTITUTION DU VACCIN

Le vaccin doit être utilisé après dilution avec du chlorure de sodium 0,9%. La stabilité physico-chimique a été démontrée pendant 6h entre 2 et 30°C. D'un point de vue microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement.

Pour toutes les informations relatives au suivi des effets indésirables, rendez-vous sur ansm.sante.fr : dossiers thématiques COVID-19-Vaccins