

Pfizer

23-25, avenue du Docteur Lannelongue
F-75668 Paris Cedex 14
Tél : (33) (0)1 58 07 30 00

Information destinée aux professionnels de santé**Tension d'approvisionnement****OCTREOTIDE HOSPIRA**

50 microgrammes/1 ml, solution injectable - boîte de 5 flacons de 1 ml (CIP 34009 394 486 5 7).

100 microgrammes/1 ml, solution injectable - boîte de 5 flacons de 1 ml (CIP 34009 394 481 3 8).

500 microgrammes/1 ml, solution injectable - boîte de 5 flacons de 1 ml (CIP 34009 394 490 2 9)

Paris, le 1^{er} février 2022

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

Nous tenons à vous informer que nous rencontrons actuellement des tensions d'approvisionnement avec risque de rupture de stock ponctuelle sur la gamme **OCTREOTIDE HOSPIRA**:

50 microgrammes/1 ml, solution injectable - boîte de 5 flacons de 1 ml (CIP 34009 394 486 5 7).

100 microgrammes/1 ml, solution injectable - boîte de 5 flacons de 1 ml (CIP 34009 394 481 3 8).

500 microgrammes/1 ml, solution injectable - boîte de 5 flacons de 1 ml (CIP 34009 394 490 2 9).

Ces spécialités font l'objet d'une distribution contingentée.

Le retour à la normale sur l'ensemble de la gamme est estimé à juillet 2022.

Il existe d'autres spécialités à base d'octréotide en solution injectable sur le marché français.

Indications thérapeutiques :

Contrôle des symptômes et diminution des taux circulants d'hormone de croissance (GH) et d'IGF-1 chez les patients acromégales mal contrôlés après chirurgie ou radiothérapie. OCTREOTIDE HOSPIRA est également indiqué chez les patients acromégales dont l'état de santé ne permet pas une intervention ou qui la refusent, et pendant la période transitoire précédant la complète efficacité de la radiothérapie.

Soulagement des symptômes associés aux tumeurs endocrines gastro-entéro-pancréatiques fonctionnelles, par exemple les tumeurs carcinoïdes avec signe(s) clinique(s) d'un syndrome carcinoïde (voir rubrique 5.1). OCTREOTIDE HOSPIRA n'est pas un médicament anticancéreux et n'est pas un traitement curatif pour ces patients.

Prévention des complications de la chirurgie pancréatique.

Traitement en urgence, et prévention de la récurrence de l'hémorragie des varices gastro-œsophagiennes chez les patients cirrhotiques. OCTREOTIDE HOSPIRA doit être utilisé en association avec une thérapie spécifique telle que la sclérothérapie endoscopique.

Traitement des adénomes thyroïdiens :

- lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie et/ou radiothérapie,
- chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical,
- chez les patients irradiés, en attente de l'efficacité de la radiothérapie.



Nous vous rappelons que tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, ou tout risque d'erreur, erreur interceptée, ou erreur avérée sans effet doit être signalé auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour tout complément d'information, déclaration de cas de pharmacovigilance ou réclamation qualité, vous pouvez nous contacter au 01 58 07 34 40 ou sur www.pfizermedicalinformation.fr.

Notre service client reste à votre disposition pour toute autre demande d'information au numéro suivant : 01 70 95 05 00.

Conscients des désagréments causés par cette situation, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de notre considération distinguée.

Franck Le Breguero
Pharmacien Responsable

Pfizer SAS