

ANNEXE IIIB

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

WEGOVY 0.25 mg solution injectable en stylo prérempli

WEGOVY 0.5 mg solution injectable en stylo prérempli

WEGOVY 1 mg solution injectable en stylo prérempli

WEGOVY 1.7 mg solution injectable en stylo prérempli

WEGOVY 2.4 mg solution injectable en stylo prérempli

sémaglutide

Encadré

- **Ce médicament n'ayant pas encore obtenu d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), son utilisation est soumise à une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) et à une procédure de surveillance étroite par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), concernant notamment les effets gênants qu'il peut provoquer.**
- **Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament** car elle contient des informations importantes pour vous.
- **Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.**
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable parlez en à votre médecin, pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que WEGOVY et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser WEGOVY ?
3. Comment utiliser WEGOVY ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver WEGOVY ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE WEGOVY ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Qu'est-ce que WEGOVY?

WEGOVY est un médicament utilisé pour la perte de poids et le maintien du poids, qui contient la substance active *sémaglutide*. Il est similaire à une hormone naturelle appelée *glucagon-like peptide-1* (GLP-1) qui est libérée par l'intestin après un repas. Il agit sur des cibles (récepteurs) dans le cerveau qui contrôlent votre appétit et vous vous sentez plus rassasié(e), vous avez moins faim et vous présentez moins d'envie irrésistible de nourriture. Cela vous aidera à manger moins et à réduire votre poids corporel.

Dans quels cas WEGOVY est-il utilisé ?

WEGOVY est utilisé avec un régime alimentaire et une activité physique pour perdre du poids et aider à maintenir le contrôle du poids. Il est utilisé chez des adultes qui ont un indice de masse corporelle (IMC) initial $\geq 40 \text{ kg/m}^2$ (obésité de classe III ou obésité morbide).

L'IMC (indice de masse corporelle) est une mesure de votre poids par rapport à votre taille.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER WEGOVY?

N'utilisez jamais WEGOVY

- si vous êtes allergique au *sémaglutide* ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament(mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser WEGOVY.

L'utilisation de WEGOVY n'est pas recommandée si vous:

- Utilisez d'autres produits pour perdre du poids
- Avez un diabète de type 1
- Avez une fonction rénale sévèrement altérée
- Avez une fonction hépatique sévèrement altérée
- Avez une insuffisance cardiaque grave
- Avez une maladie des yeux liée au diabète (rétinopathie)

L'expérience est limitée concernant l'utilisation de WEGOVY chez les patients:

- Âgés de 75 ans et plus-
- Présentant des problèmes du foie,
- Présentant des problèmes sévères de l'estomac ou des intestins, qui entraînent une vidange retardée de l'estomac (dénommés gastroparésie), ou qui sont atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin

Veillez consulter votre médecin si l'un des cas ci-dessus vous concerne.

Déshydratation

Pendant le traitement par WEGOVY vous pouvez vous sentir nauséux(se) être malade (vomissement), ou avoir des diarrhées. Ces effets indésirables peuvent entraîner une déshydratation (perte de liquide). Il est important d'éviter la déshydratation en buvant beaucoup. Ceci est particulièrement important si vous avez des problèmes de reins. Consultez votre médecin si vous avez des questions ou si vous avez des doutes.

Inflammation du pancréas

Si vous avez des douleurs intenses et persistantes au niveau de l'estomac (voir rubrique 4), consultez immédiatement votre médecin car cela pourrait être un signe d'inflammation du pancréas (pancréatite aiguë).

Personnes atteintes de diabète de type 2

WEGOVY ne peut pas être utilisé comme un substitut de l'insuline. N'utilisez pas WEGOVY en association avec d'autres médicaments qui contiennent des agonistes des récepteurs du GLP-1 (tels que le liraglutide, le dulaglutide, l'exénatide ou le lixisénatide)

Taux de sucre dans le sang trop bas (hypoglycémie)

L'association d'un sulfamide hypoglycémiant ou d'une insuline avec WEGOVY pourrait augmenter le risque de chute du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Veuillez consulter la rubrique 4, qui décrit les signes annonciateurs d'un faible taux de sucre dans le sang. Votre médecin peut vous demander de tester votre taux de sucre dans le sang. Ce contrôle aidera votre médecin à décider si votre dose de sulfamide hypoglycémiant ou d'insuline doit être modifiée pour réduire le risque de chute du taux de sucre dans le sang.

Maladie de l'œil liée au diabète (rétinopathie)

Si vous souffrez d'une maladie de l'œil liée au diabète et que vous prenez de l'insuline, ce médicament peut provoquer une détérioration de votre vision, et cela peut nécessiter un traitement. Une amélioration rapide du contrôle du taux de sucre dans le sang peut entraîner une aggravation temporaire des troubles diabétiques au niveau des yeux. Si vous souffrez d'une maladie de l'œil liée au diabète et que vous présentez des problèmes aux yeux pendant que vous prenez ce médicament, parlez en votre médecin.

Enfants et adolescents

Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans car la sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies dans ce groupe de patients.

Autres médicaments et WEGOVY

Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

En particulier, informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous utilisez un médicament contenant l'un des produits suivants :

- Warfarine ou autre médicament similaire, pris par la bouche, pour réduire la coagulation du sang (anticoagulants oraux). Lorsque vous commencez un traitement avec de la warfarine ou un médicament similaire, des analyses sanguines fréquentes visant à évaluer la capacité de votre sang à coaguler peuvent s'avérer nécessaires.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, car ses effets sur le fœtus ne sont pas connus. Il est donc recommandé d'utiliser une contraception pendant l'utilisation de ce médicament. Si vous souhaitez être enceinte, vous devez arrêter d'utiliser ce médicament au moins deux mois à l'avance. Si vous débutez une grossesse ou êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse pendant que vous utilisez ce médicament, informez-en immédiatement votre médecin, car votre traitement devra être arrêté.

N'utilisez pas ce médicament si vous allaitez car passage de ce médicament dans le lait maternel n'est pas établi.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que WEGOVY affecte votre capacité à conduire et à utiliser des machines. Certains patients peuvent ressentir des vertiges lorsqu'ils prennent WEGOVY, principalement au cours des 4 premiers mois de traitement (voir rubrique 4). Si vous ressentez des vertiges, soyez particulièrement attentif pendant la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Personnes atteintes de diabète de type 2

Si vous utilisez ce médicament en association avec un sulfamide hypoglycémiant ou de l'insuline, un faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) peut survenir et réduire votre capacité de concentration. Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous ressentez des signes quelconques de chute du taux de sucre dans le sang. Voir rubrique 2, « Avertissements et précautions » pour plus d'informations sur le risque accru de chute du taux de sucre dans le sang et la rubrique 4 pour connaître les signes annonciateurs d'un faible taux de sucre dans le sang. Veuillez consulter votre médecin pour plus d'informations.

WEGOVY contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est à dire. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT UTILISER WEGOVY ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Quelle quantité à prendre

La dose recommandée est de 2,4 mg une fois par semaine.

Votre traitement commencera à une faible dose qui sera progressivement augmentée sur une période de 16 semaines de traitement.

- Lorsque vous commencez à utiliser WEGOVY, la dose de départ est de 0,25 mg une fois par semaine.
- Votre médecin vous donnera des instructions pour augmenter progressivement votre dose toutes les 4 semaines jusqu'à ce que vous atteigniez la dose recommandée de 2,4 mg une fois par semaine.
- Une fois que vous atteignez la dose recommandée de 2,4 mg, n'augmentez pas davantage votre dose.
- Si vous vous sentez très gêné(e) par des malaises (nausées) ou par des vomissements, envisager avec votre médecin de retarder l'augmentation de la dose ou de revenir à la dose précédente jusqu'à l'amélioration des symptômes.

Habituellement, vous devrez suivre le tableau suivant.

Augmentation de la dose	Dose hebdomadaire
Semaines 1 à 4	0,25 mg
Semaines 5 à 8	0,5 mg
Semaines 9 à 12	1 mg
Semaines 13 à 16	1,7 mg
À partir de la semaine 17	2,4 mg

Votre médecin évaluera votre traitement de manière régulière.

Comment WEGOVY est administré

WEGOVY doit être administré par injection sous la peau (injection sous-cutanée). Ne l'injectez pas directement dans une veine ou dans un muscle.

- Les meilleurs endroits pour réaliser l'injection sont le devant du haut du bras, la cuisse ou le ventre.
- Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère vous montrera comment l'utiliser.

Les instructions détaillées sur la manière d'utiliser le stylo figurent au verso de cette notice.

Personnes atteintes de diabète de type 2

Informez votre médecin si vous avez un diabète de type 2. Votre médecin peut ajuster la dose de vos médicaments contre le diabète pour éviter un faible taux de sucre sanguin.

Comment utiliser WEGOVY

- Vous devez utiliser ce médicament une fois par semaine, le même jour chaque semaine si possible.
- Vous pouvez faire vous-même l'injection, quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas.

Si nécessaire, vous pouvez changer le jour de votre injection hebdomadaire de ce médicament, à condition que votre dernière injection ait eu lieu au moins 3 jours auparavant. Après la sélection d'un nouveau jour d'administration, poursuivez l'injection une fois par semaine.

Si vous avez utilisé plus de WEGOVY que vous n'auriez dû

Prévenez immédiatement votre médecin. Vous pouvez avoir des effets indésirables tels que des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, qui peuvent provoquer une déshydratation (perte de liquides).

Si vous oubliez d'utiliser WEGOVY

Si vous avez oublié d'injecter une dose et que :

- 5 jours maximum se sont écoulés depuis la date à laquelle vous auriez dû utiliser WEGOVY, injectez la dose dès que vous y pensez. Ensuite, injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu.
- plus de 5 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle vous auriez dû utiliser WEGOVY, ne prenez pas la dose manquée. Ensuite, injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour suivant prévu. N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser WEGOVY

N'arrêtez pas d'utiliser ce médicament sans avoir consulté votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables graves

Fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- Complications de la maladie de l'œil liée au diabète (rétinopathie diabétique). Si vous présentez un diabète, vous devez informer votre médecin si vous constatez des problèmes au niveau des yeux, tels que des modifications de la vue, pendant le traitement avec ce médicament.

Peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- Inflammation du pancréas (pancréatite aiguë). Les signes d'une inflammation du pancréas peuvent comprendre une douleur intense et persistante au niveau de l'estomac ; la douleur peut se déplacer dans le dos. Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.

Rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques, angioedème). Vous devez demander une aide médicale en urgence et informer immédiatement votre médecin si vous ressentez des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement, la tête qui tourne, des battements de cœur rapides, de la transpiration et une perte de conscience ou un gonflement rapide sous la peau dans les zones telles que le visage, la gorge, les bras et les jambes, qui peuvent mettre le pronostic vital en jeu si le gonflement de la gorge bloque les voies respiratoires.

Autres effets indésirables

Très fréquents : pouvant affecter plus de 1 personne sur 10

- maux de tête
- nausées
- vomissements
- diarrhée
- constipation
- maux d'estomac
- sensation de faiblesse ou de fatigue

Ces effets sont observés principalement pendant la période d'augmentation de la dose et disparaissent généralement avec le temps.

Fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- sensation de vertige
- maux de ventre ou indigestion
- rots (éructation)
- gaz (flatulences)
- ballonnements abdominaux
- inflammation de l'estomac (gastrite), les signes comprennent des douleurs d'estomac, des nausées ou des vomissements
- reflux ou brûlure d'estomac : également appelé « reflux gastro-œsophagien »
- calculs biliaires
- perte des cheveux
- réactions au site d'injection
- faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) chez les patients atteints de diabète de type 2.

Les signes annonciateurs d'un faible taux de sucre dans le sang peuvent apparaître soudainement. Ils peuvent inclure : sueurs froides, pâleur et froideur de la peau, maux de tête, rythme cardiaque rapide, nausées ou sensation de faim excessive, changements au niveau de la vision, somnolence ou faiblesse, nervosité, anxiété ou confusion, difficultés de concentration ou tremblement.

Votre médecin vous expliquera comment traiter un faible taux de sucre dans le sang et ce que vous devez faire si vous remarquez ces signes annonciateurs.

Un faible taux de sucre dans le sang risque de survenir plus fréquemment si vous prenez également un sulfamide hypoglycémiant ou une insuline. Votre médecin pourra réduire la dose de ces médicaments avant que vous ne commenciez à prendre ce médicament.

Peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- faible tension artérielle

- sensation de vertige ou tête qui tourne en se levant ou en s'asseyant en raison d'une chute de la tension artérielle
- rythme cardiaque rapide
- augmentation des enzymes pancréatiques (telles que la lipase et l'amylase) constatée par des analyses sanguines.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER WEGOVY ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du stylo et sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Avant ouverture : à conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler. Maintenir à distance de l'élément de refroidissement. Toujours conserver le stylo dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

Après première utilisation : vous pouvez conserver le stylo pendant 6 semaines à une température ne dépassant pas 30 °C ou au réfrigérateur (2°C à 8°C), à distance de l'élément de refroidissement. Ne pas congeler WEGOVY et ne pas l'utiliser s'il a été congelé. Garder le capuchon du stylo en place lorsque vous n'utilisez pas le stylo afin de le maintenir à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que la solution n'est pas limpide et incolore.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient WEGOVY

La substance active est le sémaglutide.

WEGOVY 0,25 mg, solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 1 mg de sémaglutide dans 1.5 mL de solution.

WEGOVY 0,5 mg, solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 2 mg de sémaglutide dans 1.5 mL de solution.

WEGOVY 1 mg, solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 4 mg de sémaglutide dans 3 mL de solution.

WEGOVY 1.7 mg, solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 6.8 mg de sémaglutide dans 3 mL de solution.

WEGOVY 2.4 mg, solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 9.6 mg de sémaglutide dans 3 mL de solution.

Les autres composants sont : phosphate disodique dihydraté, propylène glycol, phénol, hydroxyde de sodium/acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH à 7,4), eau pour préparations injectables

Qu'est-ce que WEGOVY et contenu de l'emballage extérieur

WEGOVY est une solution injectable limpide et incolore dans un stylo prérempli jetable.

Chaque stylo contient 4 doses. Boite de 1 stylo prérempli.

Titulaire de l'autorisation temporaire d'utilisation

NOVO NORDISK
10-12 COURS MICHELET
92800 PUTEAUX
FRANCE

Exploitant de l'autorisation temporaire d'utilisation

NOVO NORDISK
10-12 COURS MICHELET
92800 PUTEAUX
FRANCE

Fabricant

NOVO NORDISK A/S
NOVO ALLÉ
DK-2880 BAGSVÆRD
DENMARK

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres

Sans objet.

Instructions sur l'utilisation de Wegovy

Avant d'utiliser votre stylo prérempli Wegovy®, **veuillez lire attentivement ces instructions**, et discutez avec votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien pour savoir comment injecter Wegovy® correctement.

Le stylo Wegovy® est un stylo sélecteur de dose qui contient quatre doses de Wegovy®, correspondant à quatre prises hebdomadaires.

Wegovy® existe en cinq stylos différents, chacun contenant un dosage différent de sémaglutide :


0.25 mg **0.5 mg** **1 mg** **1.7 mg** **2.4 mg**

Commencez toujours par vérifier l'étiquette de votre stylo pour assurer qu'il contient le dosage de Wegovy® qui vous a été prescrit.

Votre stylo est conçu pour être utilisé avec des aiguilles NovoFine Plus, NovoFine ou NovoTwist à usage unique d'une longueur maximale de 8 mm.

Stylo Wegovy® (exemple)





Veillez noter : le stylo sur les illustrations est un exemple. La taille, la couleur et les détails sur les illustrations peuvent varier par rapport à votre stylo. Ces instructions s'appliquent à tous les stylos Wegovy®.



Aiguille NovoFine® Plus (exemple)




1 Préparation de votre stylo avec une aiguille neuve

<p>Contrôlez le nom et le dosage de votre stylo pour vous assurer qu'il contient le dosage de Wegovy® qui vous a été prescrit.</p> <p>Retirez le capuchon du stylo.</p>	
<p>Vérifiez que la solution de Wegovy® présente dans votre stylo est limpide et incolore. Regardez la fenêtre du stylo. Si la solution de Wegovy® paraît trouble ou colorée, n'utilisez pas le stylo.</p>	
<p>Utilisez toujours une aiguille neuve lors de chaque injection.</p> <p>Prenez une aiguille lorsque vous êtes prêt à faire votre injection. Vérifiez que la languette en papier et le capuchon externe de l'aiguille ne sont pas endommagés. Si vous constatez qu'ils sont abîmés, cela pourrait affecter la stérilité. Jetez l'aiguille et utilisez-en une nouvelle.</p> <p>Retirez la languette en papier.</p>	
<p>Insérez l'aiguille, de manière bien droite, sur le stylo. Tournez jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.</p>	
<p>L'aiguille est protégée par deux capuchons. Vous devez retirer les deux capuchons. Si vous oubliez d'enlever les deux capuchons, vous n'injecterez pas de Wegovy®.</p> <p>Retirez le capuchon externe de l'aiguille et conservez-le pour plus tard. Vous en aurez besoin après l'injection pour retirer l'aiguille du stylo en toute sécurité.</p> <p>Retirez le capuchon interne de l'aiguille et jetez-le. Une goutte de solution peut apparaître à la pointe de l'aiguille. Vous devez tout de même vérifier l'écoulement si vous utilisez un stylo neuf pour la</p>	

première fois. Voir "**Vérification de l'écoulement avec chaque nouveau stylo**".

N'utilisez jamais une aiguille pliée ou endommagée. Pour plus d'informations sur la manipulation des aiguilles, reportez-vous à la section "**A propos de vos aiguilles**" ci-dessous.




Vérifiez l'écoulement avec chaque nouveau stylo

Si votre stylo est déjà en cours d'utilisation, passez à l'étape 2 "**Sélection de votre dose**".

Vérifiez uniquement le bon écoulement de Wegovy® avant votre **première injection avec chaque nouveau stylo**.

Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le compteur de dose affiche la **valeur 2**.



Assurez-vous que la valeur 2 est bien alignée avec l'indicateur de dose.



Vérification de l'écoulement

Maintenez le stylo avec l'aiguille pointée vers le haut.

Appuyez sur le bouton de dose et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à 0. Le 0 doit être aligné avec l'indicateur de dose.

Une goutte de solution de Wegovy® doit apparaître à la pointe de l'aiguille. Cette goutte indique que votre stylo est prêt à être utilisé.

Si aucune goutte n'apparaît, vérifiez à nouveau l'écoulement. **Cette opération ne doit être effectuée que deux fois.**


S'il n'y a toujours pas de goutte, **jetez l'aiguille et vérifiez l'écoulement encore une fois.**

N'utilisez pas le stylo si une goutte de Wegovy® n'apparaît toujours pas.



2 Sélection de votre dose

Tournez le sélecteur de dose afin de sélectionner **la valeur correspondant à la dose** qui vous a été prescrite.




Si vous n'avez pas sélectionné la bonne valeur, vous pouvez tourner le sélecteur de dose dans un sens ou dans l'autre pour sélectionner la valeur correcte.

Le sélecteur de dose émet des clics différents lorsque vous le tournez dans un sens ou dans l'autre, ou lorsque vous dépassez la quantité de solution restant dans le stylo. Vous entendrez un "clic" chaque fois que vous tournerez le sélecteur de dose. Ne sélectionnez pas la valeur en comptant le nombre de clics que vous entendez.

Vous avez correctement sélectionné votre dose si la valeur correspondant à la dose qui vous a été prescrite est alignée avec l'indicateur de dose. Dans cette image, la valeur 16 est indiquée à titre d'exemple.


Si le compteur de dose s'arrête avant la valeur correspond à votre dose prescrite, la quantité restant de solution n'est pas suffisante pour une dose complète. Jetez le stylo et utilisez-en un nouveau.



3 Injection de votre dose


Insérez l'aiguille dans votre peau.

Assurez-vous de pouvoir voir le compteur de dose. Ne le recouvrez pas avec vos doigts. Cela pourrait interrompre l'injection.



Appuyez sur le bouton de dose et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à 0.


Maintenez le bouton de dose enfoncé avec l'aiguille dans votre peau comptez lentement jusqu'à 6. Le 0 doit être aligné avec l'indicateur de dose. Vous pourrez alors entendre ou sentir un clic lorsque le compteur de dose revient à 0.



Retirez l'aiguille de votre peau. Si l'aiguille est retirée prématurément, vous pourriez voir un flux de solution de Wegovy® s'écouler de la pointe de l'aiguille et la dose complète ne sera pas administrée.

Si du sang apparaît au niveau du site d'injection, appuyez légèrement.


Vous pourrez éventuellement voir une goutte de solution de Wegovy® à la pointe de l'aiguille après l'injection. C'est un phénomène normal et cela n'a aucune influence sur votre dose.



4 Après votre injection

Placez l'extrémité de l'aiguille à l'intérieur du capuchon externe de l'aiguille, sur une surface plane, sans toucher l'aiguille ni le capuchon externe de l'aiguille.


Quand l'aiguille est recouverte, emboîtez complètement et avec précaution le capuchon externe de l'aiguille.



Dévissez l'aiguille et jetez-la en respectant scrupuleusement les instructions de votre médecin, infirmier/ère, pharmacien ou autorités locales.

N'essayez jamais de remettre le capuchon interne de l'aiguille sur l'aiguille. Vous pourriez vous blesser avec l'aiguille.

Retirez toujours l'aiguille de votre stylo immédiatement après chaque injection afin de réduire le risque d'obstruction d'aiguilles, de contamination, d'infection, de fuite de solution et de dose incorrecte. Ne conservez jamais votre stylo avec l'aiguille attachée.



Remettez le capuchon sur votre stylo après chaque utilisation pour protéger la solution de Wegovy® de la lumière.



Lorsque le stylo est vide, jetez-le sans l'aiguille, selon les instructions de votre médecin, de votre infirmier/ère, de votre pharmacien ou des autorités locales.

<p>Le capuchon du stylo et l'emballage en carton peuvent être jetés dans votre poubelle jaune.</p>	
<p>A propos des aiguilles</p>	
<p>Les aiguilles sont des dispositifs médicaux.</p> <p>Comment détecter qu'une aiguille est bouchée ou endommagée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le compteur de dose n'affiche pas 0 alors que le bouton de dose a été maintenu enfoncé, l'aiguille que vous avez utilisée est peut-être bouchée ou endommagée. • Dans ce cas, vous n'avez pas reçu de médicament du tout, même si le compteur de dose a bougé par rapport à la dose sélectionnée au départ. <p>Comment manipuler une aiguille bouchée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Changez l'aiguille comme décrit à la section '1 Préparation de votre stylo avec une aiguille neuve' et allez à la section '2 Sélection de votre dose'. 	
<p>Entretien de votre stylo</p>	
<p>Entretenez votre stylo avec soin. Toute manipulation brutale ou mauvaise utilisation peut entraîner une dose incorrecte. Si cela se produit ce médicament n'aura peut-être pas l'effet escompté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous trouverez au dos de cette notice les conditions de conservation de votre stylo. • N'injectez pas Wegovy® s'il a été exposé à la lumière directe du soleil. • Ne pas soumettre Wegovy® au gel et n'injectez pas Wegovy® s'il a été congelé. Jetez le stylo. • Ne laissez pas tomber votre stylo et ne le heurtez pas contre des surfaces dures. • N'essayez pas de remplir votre stylo. Une fois qu'il est vide, il doit être jeté. • N'essayez pas de réparer votre stylo ou de le démonter. • N'exposez pas votre stylo à la poussière, à la saleté ou à un liquide. • Ne lavez pas votre stylo, ne le trempez pas et ne le graissez pas. Vous pouvez, si nécessaire, le nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent doux. 	
<p> Informations importantes</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • N'injectez qu'une dose de Wegovy® une fois par semaine. Si vous ne prenez pas votre Wegovy® comme prescrit, vous risquez de ne pas obtenir l'effet escompté de ce médicament. • Si vous prenez plus d'un type de médicament injectable, il est très important de vérifier le nom et la dose sur l'étiquette de votre stylo avant de l'utiliser. • Si vous êtes aveugle ou malvoyant et si vous ne pouvez pas lire le compteur de dose sur le stylo, n'utilisez pas ce stylo sans assistance. Faites appel à une personne ayant une bonne vue et qui a été formée à l'utilisation du stylo prérempli Wegovy®. • Tenez toujours votre stylo et vos aiguilles hors de la vue et de la portée des autres personnes, en particulier des enfants. • Ne partagez jamais votre stylo ou vos aiguilles avec d'autres personnes. • Les aiguilles sont à usage unique. Ne réutilisez jamais vos aiguilles, car cela peut entraîner un blocage des aiguilles, une contamination, une infection et un dosage inexact. • Le personnel soignant doit être très attentif lors de la manipulation des aiguilles usagées afin de prévenir les piqûres d'aiguilles et les infections croisées. 	

