















## VACCINS ET GROSSESSE : INFORMATION SUR LES VACCINS DISPONIBLES ET LA CONDUITE À TENIR

 Indications du vaccin	 Nom de la spécialité	 Type de vaccin	 Conduite à tenir chez la femme enceinte ou susceptible de l'être
<b>Choléra</b>	Dukoral	Vaccin recombinant inactivé contenant 4 souches de <i>Vibrio cholerae</i> sérotype O1 et la sous-unité B de la toxine cholérique recombinante (rCTB)	Peut être administré pendant la grossesse.
<b>Covid-19</b>	Comirnaty Pfizer/BioNtech Spikevax Moderna	Vaccin à ARNm	Peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.
	Vaxzevria AstraZeneca	Vaccin à adénovirus (non répliatif)	N'est pas recommandé pendant la grossesse.
	Covid-19 Vaccine Janssen	Vaccin à adénovirus (non répliatif)	
	Nuvaxovid Novavax	Vaccin recombinant avec adjuvant (saponine)	
<b>Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche (dTcaP)</b>	Repevax Boostrixtetra	Vaccin tétravalent, à teneur réduite en antigènes (dTcaP) Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé sur phosphate/hydroxyde d'aluminium)	Vaccin contre la coqueluche : peut être utilisé au cours du 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> trimestre de grossesse selon les recommandations officielles
<b>Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (dTP)</b>	Revaxis	Vaccin trivalent (inactivé) à teneur réduite en antigènes, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium	N'est pas recommandé pendant la grossesse.
<b>Encéphalite à tiques</b>	Encepur Ticovac	Vaccin monovalent (inactivé, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium)	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf en cas de réel besoin et seulement après examen approfondi des risques et bénéfices potentiels.
<b>Encéphalite japonaise</b>	Ixiaro	Vaccin monovalent (inactivé, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium)	Éviter d'utiliser pendant la grossesse.
<b>Fièvre jaune</b>	Stamaril	Vaccin vivant atténué monovalent	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf en cas de réel besoin et seulement après examen approfondi des risques et bénéfices potentiels.

 Indications du vaccin	 Nom de la spécialité	 Type de vaccin	 Conduite à tenir chez la femme enceinte ou susceptible de l'être
Grippe saisonnière	Influvac Tetra	Vaccin tétravalent (inactivé, à antigène de surface)	Peut être utilisé à tous les stades de la grossesse
	Vaxigrip Tetra	Vaccin tétravalent (inactivé, à virion fragmenté)	
Hépatite A et Fièvre Typhoïde	Tyavax	Vaccin bivalent de l'hépatite A (inactivé, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium) et typhoïdique (polyosidique)	N'est pas recommandé. Si nécessaire, privilégier les formes monovalentes.
Hépatite A	Avaxim 160 U Havrix 1440 U/1 mL Vaqta 50 U/1 mL	Vaccin monovalent (inactivé, adsorbé sur hydroxyde/hydroxyphosphate d'aluminium)	Eviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf en situation de risque de contamination important.
Hépatite B et hépatite A	Twinrix Adulte	Vaccin bivalent de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé sur phosphate d'aluminium)	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Reporter la vaccination après l'accouchement à moins d'une nécessité absolue de protéger la mère d'une infection contre l'hépatite B.
Hépatite B	Engerix B 20 HBVAXPRO 10	Vaccin monovalent (ADN recombinant adsorbé sur hydroxyde/hydroxyphosphate d'aluminium)	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf s'il est jugé clairement nécessaire.
Infections à papillomavirus humains (HPV)	Cervarix	Vaccin bivalent (HPV types 16, 18) (Recombinant, avec adjuvant ASO4, adsorbé sur hydroxyde d'aluminium)	N'est pas recommandé pendant la grossesse. Reporter la vaccination après l'accouchement.
	Gardasil 9	Vaccin nonavalent dont HPV types 16 et 18, 31, 33, 45, 52, 58 (ADNr, adsorbé sur sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium)	
Infections à pneumocoques (IP)	Prevenar 13	Vaccin 13-valent, polyosidique conjugué (adsorbé sur phosphate d'aluminium)	Eviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse.
	Pneumovax	Vaccin 23-valent, polyosidique	



 Indications du vaccin	 Nom de la spécialité	 Type de vaccin	 Conduite à tenir chez la femme enceinte ou susceptible de l'être
<b>Infections invasives à méningocoque (IIM)</b>	Vaccins méningococciques du groupe B Bexsero Trumenba	Vaccin monovalent, protéique (ADNr, composant, adsorbé sur hydroxyde/phosphate d'aluminium)	Eviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf en situation de risque manifeste d'exposition à une infection méningococcique.
	Vaccin méningococcique du groupe C Menjugate 10	Vaccin monovalent, oligosidique conjugué à la protéine CRM <sub>197</sub> (adsorbé sur hydroxyde d'aluminium)	
	Vaccin méningococcique polysidique du groupe C Neisvac	Vaccin monovalent conjugué à l'anatoxine tétanique (adsorbé sur hydroxyde d'aluminium)	
	Vaccins méningococciques des groupes A, C, W-135 et Y Menveo Nimenrix	Vaccin tétravalent conjugué à la protéine CRM <sub>197</sub> (Menveo) ou tétanique (Nimenrix)	
<b>Poliomyélite</b>	Imovax Polio	Vaccin monovalent (inactivé)	Eviter d'utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf en situation de risque important.
<b>Rage</b>	Vaccin rabique Pasteur Rabipur	Vaccin monovalent (inactivé)	Peut être utilisé pendant la grossesse lorsqu'une prophylaxie est nécessaire. En raison de la gravité de la maladie, la conduite de la vaccination ne doit pas être modifiée par la grossesse.
<b>Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR)</b>	Priorix M-M-RVaxpro	Vaccin vivant atténué trivalent	<b>Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.</b>
<b>Tuberculose</b>	BCG AJVaccines	Vaccin vivant atténué	Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf dans les zones à haut risque d'infection tuberculeuse, si le bénéfice de la vaccination l'emporte sur les risques potentiels.
<b>Fièvre Typhoïde</b>	Typhim Vi	Vaccin monovalent, polysidique	Eviter d'utiliser pendant la grossesse sauf en cas de fort risque d'exposition à la fièvre typhoïde, compte-tenu de la gravité de la maladie.
<b>Varicelle</b>	Varilrix Varivax	Vaccin vivant atténué monovalent	<b>Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.</b>
<b>Zona</b>	Zostavax	Vaccin vivant atténué monovalent	<b>Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.</b>

