

ANNEXE II

NOTICE

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) **DENOMINATION**

HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg, comprimés

b) **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE**

c) **FORME PHARMACEUTIQUE**

d) **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE**

HORMONE GLUCOCORTICOIDE
(H : Hormones).

e) **NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT**

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué comme traitement de substitution, en cas d'insuffisance surrénale (diminution ou arrêt de la sécrétion des hormones sécrétées par les glandes surrénales).

3. ATTENTION !

a) **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT**

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

b) **MISES EN GARDE SPECIALES**

Régime : il est impératif de conserver un régime normalement salé en cas d'insuffisance surrénale.

c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne jamais interrompre le traitement sans avis médical.

- Informez rapidement votre médecin de tout facteur d'agression inhabituel (fièvre, infection, maladie, intervention chirurgicale, traumatisme), car il peut être nécessaire dans ces cas d'augmenter les doses d'Hydrocortisone.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse.
Pendant l'allaitement ce médicament est à éviter.

f) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES**g) SPORTIFS**

Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

h) LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS**4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT****a) POSOLOGIE**

La posologie et la durée de traitement sont variables selon l'affection en cause.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin : respecter les doses prescrites, l'horaire des prises, la durée du traitement.

Ne jamais interrompre le traitement sans avis médical (cf. Précautions d'emploi).

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Chez l'enfant de moins de 6 ans, les comprimés seront éventuellement coupés en fonction de la posologie nécessaire, écrasés et mélangés à l'alimentation.

e) **FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE**

Ce traitement doit être administré au cours des repas.

d) **DUREE DU TRAITEMENT**

Conformez-vous à l'ordonnance de votre médecin.

e) **CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE**

Les risques sont très faibles dans les indications de ce médicament.
Cependant, en cas de prise d'une dose excessive, consultez immédiatement votre médecin.

f) **CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE**

Ne jamais prendre plusieurs doses simultanément. Si le traitement a été interrompu, contactez votre médecin traitant.

g) **RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE**

5. **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. **CONSERVATION**

a) **NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR**

b) **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

c) **MISE EN GARDE EN CAS DE SIGNES VISIBLES DE DETERIORATION**

7. **DATE DE REVISION DE LA NOTICE**

G:\GRP_VLIST\CORTICW01353.A02