

Carte de surveillance du patient

FR

Eliquis[®]

(apixaban)

Portez cette carte sur
vous en permanence

Présentez cette carte à votre pharmacien,
votre dentiste et tout autre professionnel
de santé qui vous traite.

Information destinée aux patients

- Prendre Eliquis à heures fixes, comme indiqué par votre médecin. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en apercevez et continuez de prendre votre traitement selon le schéma habituel.
- N'arrêtez pas le traitement par Eliquis sans en avoir parlé à votre médecin car vous risquez de faire un accident vasculaire cérébral ou de subir d'autres complications.
- Eliquis aide à fluidifier votre sang. Cependant, cela peut augmenter votre risque de saignement.

- Les signes et les symptômes de saignement incluent des ecchymoses ou des saignements sous la peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, des sensations vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou faiblesse, maux de têtes intenses et soudains, crachat de sang ou vomissement de sang.
- Si le saignement ne s'arrête pas de lui-même, demandez immédiatement un avis médical.
- En cas de chirurgie, informez votre médecin que vous prenez Eliquis.



**Je suis sous traitement anticoagulant avec
Eliquis (apixaban) pour prévenir la
formation de caillots sanguins.**

Information destinée aux professionnels de santé

- Eliquis (apixaban) est un anticoagulant oral agissant par inhibition directe et sélective du facteur Xa.
- Eliquis peut augmenter le risque de saignement. En cas d'évènements hémorragiques majeurs, il doit être arrêté immédiatement.
- Le traitement par Eliquis ne nécessite pas de surveillance de routine de l'exposition. Un test quantitatif calibré anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d'intervention chirurgicale d'urgence (les résultats des paramètres de la coagulation, temps de prothrombine (TP), rapport normalisé international (INR) et temps de céphaline activé (TCA) ne sont pas recommandés) - voir le RCP
- Un agent permettant d'inverser l'activité de l'anti-Facteur Xa d'apixaban est disponible.

Veillez compléter cette section ou demander à votre médecin de le faire

Nom : _____

Date de naissance : _____

Indication : _____

Dose : _____ mg deux fois par jour

Nom du médecin : _____

N° de téléphone du médecin : _____



Bristol-Myers Squibb

