



VACCIN COVID-19 VIDPREVTYN BETA DE SANOFI PASTEUR

QUE FAIRE EN CAS D'EFFETS INDESIRABLES ?

VOUS RESSENTEZ OU AVEZ EU

- Maux de tête
- Douleur musculaire
- Douleur articulaire
- Sensation de malaise
- Frissons
- Douleur à l'endroit où le vaccin est injecté
- Fièvre ($\geq 38^\circ\text{C}$)
- Fatigue

- Nausées
- Diarrhées
- Rougeur ou gonflement à l'endroit où le vaccin est injecté
- Ganglions lymphatiques élargis
- Démangeaisons, bleus (ecchymose) ou chaleur à l'endroit où le vaccin est injecté

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Ces effets sont connus et, pour certains, communs à toute vaccination. Désagréables, ils ne sont **pas graves et disparaissent spontanément** en quelques jours.

Ces effets peuvent être **peu à très fréquents**.

CE QU'IL FAUT FAIRE

Si les effets ne passent pas spontanément en quelques jours, **rapprochez-vous d'un professionnel de santé** (pharmacien ou médecin).

En cas de fièvre et/ou de douleurs, nous conseillons de privilégier l'utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps possible.

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable sur le portail des signalements signalement.social-sante.gouv.fr ou rapprochez-vous d'un professionnel de santé. Privilégiez la déclaration des effets graves et/ou inattendus.