

## VACCINATION CONTRE LE COVID-19

Mise à disposition du vaccin Comirnaty pédiatrique 3 microgrammes/dose à diluer, pour les nourrissons et enfants de 6 mois à 4 ans

# ATTENTION

Risque de confusion entre les flacons des 5 vaccins COMIRNATY disponibles

<p>Vaccin adulte pour les 12 ans et plus</p> <p><b>À DILUER</b></p> <p>(Pfizer BioNTech)</p> <p><b>bouchon violet</b></p> 	<p>2 vaccins adulte pour les 12 ans et plus</p> <p><b>DÉJÀ DILUÉS, PRÊTS À L'EMPLOI</b></p> <p>(Pfizer BioNTech)</p> <p><b>bouchon gris</b></p>  <p>Primovaccination    Doses de rappel</p>	<p>Vaccin pédiatrique pour les 5-11 ans</p> <p><b>À DILUER</b></p> <p>(Pfizer BioNTech)</p> <p><b>bouchon orange</b></p> 	<p>Vaccin pédiatrique pour les 6 mois-4 ans</p> <p><b>À DILUER</b></p> <p>(Pfizer BioNTech)</p> <p><b>bouchon bordeaux</b></p> 
---	--	--	--

## POUR PRÉVENIR CE RISQUE

- ♦ Ranger séparément les différents types de flacons au niveau du stockage
- ♦ Dans la mesure du possible, reconstituer les flacons à diluer (adulte bouchon violet et pédiatrique bouchons orange et bordeaux) au dernier moment
- ♦ Bien identifier le flacon avant toute administration : lire l'étiquette et vérifier la couleur du bouchon

## RAPPELS : RECONSTITUTION ET CONDITIONS DE CONSERVATION DES VACCINS

Volume de diluant nécessaire pour la reconstitution (chlorure de sodium 0,9 %)

1,8 ml	PAS DE DILUTION	1,3 ml	2,2 ml
Volume de la dose injectée			
0,3 ml	0,3 ml	0,2 ml	0,2 ml
Conservation au congélateur (-90°C à -60°C)			
18 mois	18 mois	18 mois	18 mois
Conservation au réfrigérateur (2°C à 8°C)			
1 mois	10 semaines	10 semaines	10 semaines

Pour toutes les informations relatives au suivi des effets indésirables, rendez-vous sur [ansm.sante.fr](https://ansm.sante.fr) : dossiers thématiques COVID-19-Vaccins