

Vaccins COVID-19 Spikevax* et Comirnaty**

QUE FAIRE EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES ?



 VOUS RESSENTEZ OU AVEZ EU	 CE QU'IL FAUT SAVOIR	 CE QU'IL FAUT FAIRE
<ul style="list-style-type: none"> • une douleur au point d'injection. • de la fatigue, des maux de tête • des frissons, de la fièvre • des douleurs articulaires, musculaires • des diarrhées • de l'insomnie** • une transpiration excessive (jour ou nuit)** • une diminution de l'appétit** • une sensation de faiblesse ou de manque d'énergie/ somnolence** • des nausées, des vomissements • une réaction au point d'injection (rougeur, urticaire, gonflement) ; pour Moderna, ces réactions peuvent être retardées • une éruption cutanée 	<p>Ils sont connus et, pour certains, communs à toute vaccination. Désagréables, ils ne sont pas graves et disparaissent spontanément en quelques jours.</p>	<p>Si les effets ne passent pas spontanément en quelques jours, rappechez-vous d'un professionnel de santé (pharmacien ou médecin). En cas de fièvre et/ou de douleurs, nous conseillons de privilégier l'utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps possible.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • une douleur aux extrémités (mains, pieds) • un gonflement des ganglions lymphatiques • des insomnies • des malaises, des vertiges • des démangeaisons au point d'injection 	<p>Ces effets sont connus et pour certains, communs à toute vaccination. Ils sont entre peu et très fréquents.</p>	<p>Si vous êtes géné(e), rappechez-vous d'un professionnel de santé (pharmacien ou médecin). Vous serez pris(e) en charge si nécessaire.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • une hypoesthésie (diminution des sensations ou de la sensibilité, en particulier au niveau de la peau) ou une paresthésie (sensation inhabituelle au niveau de la peau, comme un picotement ou fourmillement) 	<p>La fréquence de ces effets est encore indéterminée.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • saignements menstruels importants 	<p>La fréquence de ces effets est encore indéterminée. La plupart des cas se sont révélés de nature non grave et temporaire.</p>	<p>En cas de troubles du cycle menstruel inhabituels et persistants depuis plusieurs mois, d'aggravation d'une maladie gynécologique préexistante, ayant conduit à des examens complémentaires ou ayant des conséquences majeures rendant les actes de la vie quotidienne non possibles, rappechez-vous de votre médecin.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • une paralysie faciale 	<p>La paralysie faciale est rare et disparaît généralement en quelques semaines.</p>	<p>Prenez immédiatement contact avec un professionnel</p>
<ul style="list-style-type: none"> • un gonflement du visage 	<p>Le gonflement du visage survient chez les patients qui ont reçu des injections cosmétiques du visage.</p>	<p>de santé (médecin ou le 15) pour être pris en charge.</p>

Certains effets sont spécifiques à Moderna et d'autres à Pfizer** : ils sont respectivement signalés par une ou deux astérisques. Lorsque ce n'est pas précisé, il s'agit d'un effet commun.

Vaccins COVID-19 Moderna* et Pfizer**

QUE FAIRE EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES ?

 VOUS RESSENTEZ OU AVEZ EU	 CE QU'IL FAUT SAVOIR	 CE QU'IL FAUT FAIRE
<ul style="list-style-type: none">• une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) ou inflammation de la muqueuse située à l'extérieur du cœur (péricardite) pouvant entraîner un essoufflement, des palpitations ou des douleurs à la poitrine	La fréquence de ces effets est très rare . Ils surviennent généralement dans les 14 jours suivant la vaccination.	
<ul style="list-style-type: none">• réaction cutanée qui provoque des taches ou des plaques rouges sur la peau, qui peuvent ressembler à une cible ou à une "cocarde" avec un centre rouge foncé entouré d'anneaux rouges plus pâles (érythème polymorphe)• une réaction allergique (urticaire, gonflement du visage, choc anaphylactique,...)• un gonflement étendu du membre vacciné	Ces effets d' intensité légère à importante sont connus. La fréquence de ces réactions est encore indéterminée.	Prenez immédiatement contact avec un professionnel de santé (médecin ou le 15) pour être pris en charge.
<ul style="list-style-type: none">• un effet non mentionné précédemment, de sévérité légère, modérée ou intense	Vous faites une réaction qui n'a pas été observée lors des essais cliniques .	Prenez contact avec un professionnel de santé (pharmacien, médecin ou le 15 en fonction de la sévérité).

Certains effets sont spécifiques à Spikevax et d'autres à Comirnaty** : ils sont respectivement signalés par une ou deux astérisques. Lorsque ce n'est pas précisé, il s'agit d'un effet commun.

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable sur le portail des signalements en complétant le formulaire en ligne : signalement.social-sante.gouv.fr/  ou rapprochez-vous d'un professionnel de santé. Privilégiez la déclaration des effets graves et/ou inattendus.

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>