

Pour plus d'informations,
consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit,
sur la base de données publique des médicaments :
<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

ou flashez ce QR code



KYOWA KIRIN

MARR-ABS-2023-03_Février 2023

Ce document est diffusé par les laboratoires commercialisant des médicaments à base de fentanyl (comprimé sublingual), sous l'autorité de l'ANSM.

Fentanyl

(comprimé sublingual)

RÉGLETTE DE TITRATION

Traitement des Accès Dououreux Paroxystiques (ADP) chez les patients adultes utilisant des morphiniques pour traiter les douleurs chroniques d'origine cancéreuse.

L'Accès Dououreux Paroxystique est une exacerbation passagère d'une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond.

La dose optimale de fentanyl (comprimé sublingual) doit être déterminée pour chaque patient par titration progressive. Les patients qui utilisent du fentanyl (comprimé sublingual) pour la première fois doivent commencer par un comprimé dosé à 100 µg. Un maximum de deux comprimés peut être pris à chaque épisode (1 dose). Les patients ne doivent pas recevoir plus de 4 doses (8 comprimés) de fentanyl (comprimé sublingual) par jour : au-delà le traitement de la douleur de fond doit être réévalué.

KYOWA KIRIN

1^{ER} COMPRIMÉ



Après 15-30 min,
la douleur est-elle soulagée ?

NON

administrer un
2^{ème} comprimé de :

OUI



Au prochain épisode,
prendre un comprimé
à la dose indiquée ci-dessous

