

# PENTHROX<sup>®</sup>

(méthoxyflurane, liquide pour inhalation par vapeur de 3 mL)

## A vérifier avant l'administration

### INFORMATIONS IMPORTANTES DE RÉDUCTION DU RISQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

*Cette liste est essentielle pour assurer une utilisation correcte du méthoxyflurane et une gestion appropriée des risques. Avant d'utiliser du méthoxyflurane **A V É R I F I E R** ! s'il vous plaît:*

### NE PAS administrer du méthoxyflurane si le patient présente un de ces risques

- A Agés de moins de 18 ans**
- V Ventilation** (dépression respiratoire)
- É État de conscience** altéré (y compris dû à traumatisme crânien, drogue, alcool)
- R Rein** (atteinte rénale cliniquement significative)
- I Interaction** médicamenteuse (voir au verso)
- F Foie** (antécédent de toxicité hépatique avec le méthoxyflurane ou avec des anesthésiques halogénés)
- I Instabilité cardiovasculaire**
- É Élévation de la température** (hyperthermie maligne connue ou prédisposition génétique)
- R Réaction d'hypersensibilité** connue au méthoxyflurane ou à l'un des excipients
- ! Administration:** ne pas dépasser 2 flacons par administration et 5 flacons par semaine

## Expliquez au patient les instructions pour une bonne administration de PENTHROX®

### RAPPEL

- Veuillez lire le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et remettre au patient la notice d'information. Ces informations sont disponibles également sur: [www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr](http://www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)
- Veillez à administrer la dose antalgique efficace la plus faible et à ce que la dose maximale de 6 mL ne soit pas dépassée (soit 2 flacons par administration).

### ASSOCIATIONS À ÉVITER

- Inducteurs enzymatiques du CYP 450 (exemples : alcool, isoniazide, phénobarbital, rifampicine, carbamazépine, éfavirenz, ou névirapine)
- Médicaments connus pour avoir un effet néphrotoxique (exemples: produits de contraste ou certains antibiotiques tels que tétracycline, gentamicine, colistine, polymyxine B ou amphotéricine B).
- Sévoflurane en anesthésie (augmentation des concentrations sériques des ions fluorure associés à la néphrotoxicité du méthoxyflurane).

L'utilisation concomitante du méthoxyflurane avec des dépresseurs du Système Nerveux Central (SNC) peut augmenter les effets dépresseurs, les patients doivent faire l'objet d'une surveillance étroite.

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr/> Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>

© PENTHROX est une marque enregistrée de Medical Developments International Limited.



Medical Developments NED B.V.  
Strawinskylaan 411, WTC Tower A 1077XX  
Amsterdam – Netherlands