


ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données.

RÉSULTATS 2022

En 2022, 107 pharmacies sur 1422 ont participé à l'enquête (taux de participation : 7,5 %) et 338 malades ont été inclus.



Nombre moyen de malades par pharmacie par semaine (2006-2022)

PRESCRIPTEURS

Les médecins libéraux représentaient 83,7 % des prescripteurs, les hospitaliers 16,3 %.

Dans 84 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 16 % des cas, un autre spécialiste (cancérologue : 6,8 %, chirurgien : 2,1 %, hépato-gastroentérologue : 1,2 %, urgentiste : 0,9 %, algologue : 0,9 %, autres : 4,1 %).


MÉDICAMENTS

Les médicaments les plus prescrits sont :

- par DCI : morphine (40,3 % vs 35,6 % en 2021), oxycodone (30,6 % vs 33,9 % en 2021) et fentanyl (28,2 % vs 29,6 % en 2021).

- par spécialité : Skenan® (18,7 %), Actiskenan® (17,4 %) Oxycontin® (15,4 %), Oxynorm(oro)® (15,4 %) et Durogesic® (14,1 %). Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 18,8 % des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 41,3 % des cas.

PRESCRIPTION (%) DES MÉDICAMENTS PAR INDICATION



La méthadone a été prescrite chez deux malades (0,7 %) pour des indications cancérologiques.

Conformité des ordonnances	%
ordonnance sécurisée	96,2
posologie en lettres	93,5
carré de sécurité rempli	92,9
espace étroit dernière ligne/signature	71,1


CARACTÉRISTIQUES DES MALADES

Il y avait 58 % de femmes et 42 % d'hommes.

L'âge moyen était de 67,7 ans (médiane : 68 ; extrêmes : 18 - 105 ans) ; 38,4 % avaient 75 ans ou plus.

INDICATIONS

Dans 66 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique, dans 17,8 % des cas, d'une douleur aiguë et dans 1,2 % des cas, les deux.



CONCLUSION

En 2022, les prescriptions de morphine sont en hausse, devant l'oxycodone puis le fentanyl. Elle est majoritairement prescrite dans les indications rhumatologiques et cancérologiques. Les prescriptions d'oxycodone sont en baisse dans les indications cancérologiques et « autres ».

Les prescriptions de fentanyl sont stables mais avec une hausse des indications cancérologiques, tant pour la forme transdermique que transmuqueuse.

Il y a toujours des prescriptions hors AMM de fentanyl transmuqueux, mais les posologies sont mieux respectées. Toutes molécules confondues :

- Les indications rhumatologiques et cancérologiques sont majoritaires et en hausse,
- Les indications neurologiques sont stables et les indications « autres » diminuent, la morphine et l'oxycodone étant les principales molécules prescrites dans cette indication.

Le réseau des centres d'Addictovigilance remercie chaleureusement tous les pharmaciens ayant participé à l'enquête ASOS 22

Enquête réalisée avec le soutien de l'ANSM