Lilly France

24 boulevard Vital Bouhot - CS 50004 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél.: 01 55 49 34 34 – Fax: 01 41 44 02 47

www.lilly.com/fr

Information à l'attention des médecins prescripteurs

Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2024

**Objet** : Tension d'approvisionnement de la spécialité Humalog® 100 UI/mL, *insuline lispro*, solution injectable en flacon de 10 mL, CIP 3400934142680.

Chère Consœur, Cher Confrère,

Nous vous informons d'une tension d'approvisionnement de la spécialité **Humalog® 100 UI/mL (insuline lispro),** solution injectable en flacon de 10 mL à compter de début avril 2024 qui perdurera jusqu'à mi-avril 2024. Cette tension est la conséquence d'un retard d'approvisionnement.

Les autres formes pharmaceutiques de la spécialité ne sont pas concernées par la tension d'approvisionnement.

Dans ce contexte et en accord avec l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), afin d'éviter une rupture sèche, nous mettons en place une mesure de contingentement quantitatif des grossistes-répartiteurs en fonction des stocks disponibles jusqu'au retour à une situation normale.

En cas d'indisponibilité immédiate en pharmacie de ville, Lilly France met en place un stock limité d'Humalog® flacon pour les dépannages d'urgence via notre Service Clients au 01 55 49 33 21.

Si la difficulté d'approvisionnement devait persister, il conviendrait alors d'envisager un transfert vers une autre insuline d'action rapide en flacon ou Lyumjev® 100 unités/mL (insuline lispro) solution injectable en flacon. Une nouvelle prescription incluant cette alternative sera nécessaire, associée aux conseils adéquats pour l'administration.

Nous vous rappelons que la présentation flacon convient pour l'administration sous-cutanée en continu en utilisant une pompe à insuline.

Le remplacement d'Humalog® 100 UI/mL flacon par Lyumjev® 100 unités/mL flacon peut être effectué dose pour dose. Il est cependant à noter que le délai d'action de Lyumjev® est plus rapide que celui d'Humalog®, ce qui peut entraîner une augmentation de l'effet hypoglycémiant précoce. Conformément au résumé des caractéristiques du produit, l'administration de Lyumjev® doit se faire entre zéro et deux minutes (0-2 min) avant le début du repas, et possiblement jusqu'à 20 minutes après le début du repas.

En cas de changement de type ou de marque d'insuline, le patient devra faire l'objet d'un suivi médical attentif et potentiellement d'un ajustement de la dose.

Nous vous remercions de bien vouloir partager ces informations auprès des professionnels de santé concernés au sein de votre établissement.

Nous sommes conscients des difficultés que cette situation peut engendrer pour vos patients et leur entourage, et nous mettons tout en œuvre pour assurer un approvisionnement normal dans les plus brefs délais.

Pour toute demande d'information médicale complémentaire, vous pouvez contacter notre département d'Information Médicale (<u>www.lillymedical.fr</u>).

Nous yous prions d'agréer, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de nos salutations distinguées.

Myriam ROSILIO Gilles HUBERT

Directrice Médicale, unité Diabète et Obésité Pharmacien Responsable