

Coordonnées importantes pour contacter immédiatement votre médecin en cas d'apparition des symptômes ci-dessus

Nom du médecin prescripteur Téléphone du bureau

Mon nom

Mon téléphone

Pour plus d'informations, consultez la notice de KEYTRUDA® dans la boîte de votre médicament ou sur [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) ou <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Téléphone après les heures de bureau

Coordonnées de la personne de confiance en cas d'urgence

FR-KEY-00829 - Février 2024

# KEYTRUDA® (pembrolizumab)

DIFFUSÉ SOUS L'AUTORITÉ DE L'ANSM

Carte patient



### Informations importantes pour les professionnels de santé : ce patient est traité par KEYTRUDA® (pembrolizumab).

Ce médicament peut provoquer des **effets indésirables à médiation immunitaire graves**, y compris des cas sévères et d'issue fatale, qui peuvent survenir à tout moment pendant le traitement, voire jusqu'à plusieurs mois après la fin du traitement. Ces effets indésirables à médiation immunitaire affectant plus d'un système d'organes peuvent survenir simultanément.

Il convient d'évaluer les patients notamment pour les signes et symptômes d'effets indésirables à médiation immunitaire décrits ci-dessus. Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire leurs conséquences graves.

En cas de suspicion d'effets indésirables à médiation immunitaire, **prévenir immédiatement le médecin prescripteur** et initier une évaluation appropriée pour confirmer l'étiologie médicamenteuse et éliminer les autres causes. Le médecin prescripteur doit discuter avec le patient des risques du traitement par KEYTRUDA® et cette carte est remise au patient avec chaque prescription. Pour connaître les **recommandations spécifiques de prise en charge** de ces effets indésirables en fonction de la sévérité de l'effet (traitement symptomatique, suspension de traitement avec administration de corticostéroïdes, voire arrêt définitif du traitement), consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit de KEYTRUDA®.

Une consultation avec un médecin oncologue ou un autre spécialiste peut aider à la prise en charge des effets indésirables à médiation immunitaire spécifiques à un organe.

> Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné sur cette carte. Vous pouvez aussi déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

> Peut provoquer des effets indésirables de type inflammatoire graves pouvant parfois engager le pronostic vital et conduire au décès. Ces effets indésirables peuvent se produire à tout moment au cours du traitement ou même après la fin du traitement. Vous pouvez présenter plus d'un effet indésirable en même temps.

Si vous présentez l'un des symptômes suivants, veuillez appelez ou consultez immédiatement votre médecin, car non pris en charge par un professionnel de santé, ces effets indésirables peuvent devenir plus graves. Votre médecin pourra vous donner d'autres médicaments pour éviter des complications plus sévères et diminuer vos symptômes. Il pourra suspendre la prochaine injection prévue de KEYTRUDA® ou arrêter définitivement votre traitement.

## IMPORTANT

- N'essayez pas de traiter vous-même les effets indésirables, car non pris en charge immédiatement par un professionnel de santé, ils peuvent s'aggraver.
- N'interrompez pas le traitement par KEYTRUDA®, sauf si vous en avez discuté avec votre médecin.
- **Conservez cette carte sur vous en permanence**, pour la montrer chaque fois que vous consultez un professionnel de santé, que vous allez aux urgences. Gardez-la toujours avec vous, y compris quand vous voyagez.

### Poumons

- essoufflement
- douleur thoracique
- toux

### Intestins / Estomac

- diarrhées ou selles plus fréquentes qu'habituellement
- selles noires, goudroneuses, collantes ou selles présentant du sang ou du mucus
- douleurs sévères/sensibilité au ventre
- nausées ou vomissements

### Foie

- nausées ou vomissements
- sensation de manque d'appétit
- douleurs au côté droit du ventre
- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- urines foncées
- saignements ou bleus apparaissant plus facilement que d'habitude
- fatigue
- démangeaisons

### Reins / Vessie

- changements dans la quantité ou la couleur de votre urine
- besoin d'uriner plus fréquemment
- difficultés à uriner ou incontinence

### Glandes hormonales (thyroïde / hypophyse / surrénale)

- battements rapides du cœur
- perte ou prise de poids
- augmentation de la transpiration
- chute des cheveux
- sensation de froid
- constipation
- voix plus grave
- douleurs musculaires
- vertiges ou malaises
- maux de tête persistants ou mal de tête inhabituel

### Diabète de type 1, incluant l'acidocétose diabétique (acides en excès dans le sang, due au diabète), pancréas

- sensation de faim ou de soif plus importante que d'habitude
- besoin d'uriner plus fréquemment
- perte de poids
- sensation de fatigue ou sensation de malaise
- douleurs à l'estomac, douleurs abdominales
- respiration rapide et profonde
- confusion
- somnolence inhabituelle
- haleine avec une odeur sucrée
- goût sucré ou métallique dans votre bouche
- odeur différente des urines ou de votre transpiration
- nausées et vomissements

### Yeux

- modification de la vue

### Cerveau / Système nerveux

- confusion, problème de mémoire
- fièvre ou convulsions
- constipation

### Peau

- rash, démangeaisons, cloques
- desquamation ou lésions et/ou ulcères de la bouche ou des muqueuses nasales, de la gorge ou de la zone génitale

### Cœur

- essoufflement
- battements du cœur irréguliers
- sensation de fatigue
- douleur dans la poitrine

### Muscles

- douleur ou faiblesse musculaire
- engourdissement, picotements ou faiblesse dans les bras ou les jambes
- crampes ou spasmes musculaires, fatigue

### Réaction à la perfusion

- essoufflement
- démangeaisons/rash
- vertiges
- fièvres, frissons

