

PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.⁽¹⁾

Protocole d'administration : tableau des posologies

POIDS DU PATIENT	POSOLOGIE PAR ADMINISTRATION	VOLUME PAR ADMINISTRATION	VOLUME MAXIMAL PAR ADMINISTRATION SUR LA BASE DES LIMITES SUPÉRIEURES DU POIDS DU GROUPE (ML)*	POSOLOGIE JOURNALIÈRE MAXIMALE
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg à ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg sans dépasser 2 g
> 33 kg à ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg sans dépasser 3 g
> 50 kg avec des facteurs de risque d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg sans facteur de risque d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	4 g

10 mg = 1 ml

Poids du patient kg

Volume ml

Quantité mg

*Les patients ayant un poids inférieur doivent recevoir des volumes plus réduits.

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est de 6 heures au minimum.

Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

⁽¹⁾Résumé des Caractéristiques du Produit

