

Information destinée aux professionnels de santé**FORTES TENSIONS D'APPROVISIONNEMENT****CLARITHROMYCINE VIATRIS 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable****ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable**

(clarithromycine)

Madame, Monsieur,

Les tensions en clarithromycine sous forme de suspension buvable dosée à 25 mg/ml observées sur l'ensemble du territoire s'intensifient.

Suite à des difficultés de production chez notre fabricant, nous vous informons de fortes tensions d'approvisionnement pour nos spécialités :

- **CLARITHROMYCINE VIATRIS 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable (CIP 34009 385 025 9 6)**
- **ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable (CIP 34009 345 655 1 9)**

Nous prévoyons à ce jour un retour à un approvisionnement normal pour ces spécialités début 2025.

Dans ce contexte de fortes tensions, des préconisations ont été élaborées afin d'assurer la continuité de traitement des plus jeunes enfants, et ce dans le respect des recommandations de bon usage de la clarithromycine.

Voir : <https://ansm.sante.fr/actualites/tensions-dapprovisionnement-en-clarithromycine-25-mg-ml-suspension-buvable-nos-preconisations-pour-assurer-le-traitement-des-plus-jeunes-enfants>

En pratique de ville, consignes pendant cette période de fortes tensions :

Pour les médecins :

- **Enfant pesant moins de 4 kg** : prescrire **clarithromycine à 25 mg/ml** suspension buvable
 - **Enfant pesant 4 kg ou plus** : prescrire **clarithromycine à 50 mg/ml** suspension buvable (*seringue doseuse avec marquage du poids à partir de 4 kg*)
 - **Quel que soit le poids de l'enfant** : anticiper l'éventuelle indisponibilité de la clarithromycine buvable en co-prescrivant, en alternative, **azithromycine à 40 mg/ml** suspension buvable (*seringue-doseuse graduée à partir de 0 kg, avec marquage du poids à partir de 5 kg*) et en mentionnant son schéma d'administration sur l'ordonnance
- Toujours bien préciser **les présentations et les dosages des médicaments prescrits, ainsi que le poids de l'enfant sur l'ordonnance** pour faciliter la dispensation et l'administration à l'enfant

Pour les pharmaciens :

- **Clarithromycine à 25 mg/ml, suspension buvable** : A réserver aux enfants pesant **moins de 4 kg**

➔ Une procédure de dépannage d'urgence en clarithromycine à 25 mg/ml suspension buvable est mise en place. Si nécessaire, contacter notre service client ville au numéro de téléphone suivant : 0 800 30 31 32

- **Clarithromycine à 50 mg/ml, suspension buvable** : A réserver aux enfants **pesant 4 kg ou plus**
 - **En alternative, azithromycine à 40 mg/ml suspension buvable** à dispenser en remplacement de la clarithromycine buvable, **à condition que le médecin l'ait indiqué sur l'ordonnance** ou après avoir contacté le médecin si l'ordonnance ne le mentionne pas
- **Toutes les graduations des seringue-doseuses ne sont pas marquées d'un poids en kg. S'assurer de la compréhension des parents sur la lecture de la dose à faire prendre à l'enfant, en particulier s'ils ne retrouvent pas le nombre de kg correspondant au poids de l'enfant sur les graduations**

Une information sur les AMM des spécialités concernées est disponible sur la base de données publique des médicaments : <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Information médicale

Pour toute question d'information médicale, nous vous invitons à contacter notre service d'information médicale VIATRIS au : 0 800 12 35 50.

Déclaration des effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation.



Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Anne Yvon
Pharmacien Responsable