

Que faut-il savoir sur Xarelto ?

- ◆ Xarelto fluidifie le sang, ce qui protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- ◆ Xarelto doit être pris exactement comme le médecin l'a prescrit.
Ne jamais sauter une dose du médicament afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- ◆ Vous ne devez jamais arrêter de donner/prendre Xarelto sans en parler d'abord au médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.

- ◆ Informez le médecin ou pharmacien si vous/l'enfant prenez/prend, avez/a récemment pris ou pourriez/pourrait prendre tout autre médicament, avant de prendre Xarelto.
- ◆ Informez le médecin que vous/l'enfant êtes/est traité par Xarelto avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à un médecin ou à un pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Xarelto, il est important de connaître les éventuels effets indésirables.

Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous/l'enfant présentez/présente un risque de saignement inhabituel, il ne faut pas commencer à donner/prendre Xarelto sans en avoir parlé d'abord avec un médecin. Prévenez immédiatement un professionnel de santé si vous/l'enfant présentez/présente des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- ◆ douleurs
- ◆ gonflement ou sensations d'inconfort
- ◆ maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ◆ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper
- ◆ menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire

- ◆ sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- ◆ si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café

Comment dois-je donner Xarelto à l'enfant ? / Comment dois-je prendre Xarelto ?

- ◆ Pour garantir une protection optimale, Xarelto 1mg/mL doit être donné/pris au cours de l'alimentation (lait maternel ou lait infantile) ou au cours d'un repas.
- Il peut être administré via une sonde nasogastrique ou une sonde gastrique.

91249531 FR

Carte de Surveillance du Patient



Xarelto® 1 mg/mL
Granulés pour suspension buvable

Informations aux aidants/patients :

- ◆ Gardez toujours cette carte sur vous
- ◆ Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste avant de commencer un traitement pour le patient

Regardez la vidéo éducative montrant comment préparer et administrer la suspension buvable



go.bayer.com/junior

Le patient qui est sous traitement anticoagulant par Xarelto (rivaroxaban).

Nom :	Autres médicaments/Pathologies :
Adresse :	
Date de naissance :	Poids :

En cas d'urgence, veuillez prévenir :

Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

Cachet du médecin :

Veuillez aussi prévenir :

Nom :

Téléphone :

Lien avec le patient :

Information à destination des professionnels de santé :

- ◆ Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Xarelto.

