

Pfizer
23-25, avenue du Docteur Lannelongue
F-75668 Paris Cedex 14
Tél : (33) (0)1 58 07 30 00

**Information importante A REMETTRE AU PATIENT recevant des unités de remplacement importées de Suède dans le contexte de la tension d’approvisionnement
ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé**

Paris, le 08 janvier 2025



Madame, Monsieur,

Votre pharmacien vient de vous remettre une ou plusieurs boites de **ZYVOXID 600 mg filmdragerade tabletter** initialement destinées au marché suédois.

Nous tenons à vous informer que dans le cadre de la tension d’approvisionnement **ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé** (Boite de 10 comprimés – CIP 34009 563 139 5 2), notre laboratoire met à votre disposition, à titre exceptionnel et transitoire, ces boites en provenance de Suède et ce, en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

Les compositions quantitative et qualitative, les modalités d’utilisation, les conditions de conservation et le nombre de comprimés dans la boite de la spécialité importée sont identiques à ceux de la spécialité française.

Nous attirons votre attention sur les différences suivantes entre la spécialité française et la spécialité suédoise :

	ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé spécialité française	ZYVOXID 600 mg filmdragerade tabletter spécialité importée de Suède
Langue utilisée	Français	Suédois et Finnois
Pictogramme « Conduite de véhicule »		<i>Pictogramme absent.</i> Le pictogramme de la spécialité française s’applique également à la spécialité importée
Pictogramme « Grossesse »	 <p>Les données actuelles n'excluent pas la possibilité d'effets indésirables sur le développement embryofœtal. L'utilisation du linézolide n'est pas recommandée chez la femme enceinte sans avoir évalué au préalable les bénéfices par rapport aux risques.</p>	<i>Pictogramme absent.</i> Le pictogramme de la spécialité française s’applique également à la spécialité importée

Pour toute question ou demande d’information sur votre traitement, nous vous invitons à vous rapprocher de votre médecin prescripteur.

Une copie de la notice française de la spécialité **ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé** est attachée à ce courrier.

Pour tout(e) complément d’information, déclaration de cas de pharmacovigilance ou réclamation qualité, vous pouvez nous contacter au **01 58 07 34 40** ou sur www.pfizermedicalinformation.fr.

Franck Le Breguero
Pharmacien Responsable

ZYVOXID® 600 mg, comprimé pelliculé

Linézolide

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Autres antibactériens - code ATC : J 01 XX 08.

ZYVOXID est un antibiotique du groupe des oxazolidinones qui agit en arrêtant la croissance de certaines bactéries (germes) responsables d'infections. Il est utilisé pour traiter les pneumonies et certaines infections cutanées ou sous-cutanées. Votre médecin décidera si ZYVOXID est un traitement qui convient pour le traitement de votre infection.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au linézolide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament connu sous le nom d'inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO, par exemple phénelzine, isocarboxazide, sélégiline, moclobémide). Ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson.
- si vous allaitez parce que ZYVOXID passe dans le lait maternel et pourrait avoir des effets chez le bébé.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé.

ZYVOXID peut ne pas vous convenir si vous répondez **oui** à l'une des questions suivantes. Dans ce cas, vous devez informer votre médecin car il devra contrôler votre état de santé général et votre pression artérielle avant et pendant votre traitement, ou pourra décider qu'un autre traitement est plus approprié à votre cas.

Demandez plus d'informations à votre médecin si vous n'êtes pas sûr qu'une de ces catégories s'applique à vous.

- Avez-vous une pression artérielle élevée, que vous soyez traité ou pas pour cela ?
- Une maladie de la thyroïde a-t-elle été diagnostiquée chez vous ?
- Avez-vous une tumeur des glandes surrénales (phéochromocytome) ou un syndrome carcinoïde (dû à des tumeurs du système hormonal accompagnées de symptômes tels que diarrhée, rougeur cutanée, respiration sifflante) ?
- Souffrez-vous de syndrome maniaco-dépressif, de trouble schizoaffectif, de confusion mentale ou d'autres problèmes mentaux ?
- Avez-vous des antécédents d'hyponatrémie (faibles taux de sodium dans le sang) ou prenez-vous des médicaments qui diminuent les taux de sodium dans le sang par exemple certains diurétiques comme l'hydrochlorothiazide ?
- Prenez-vous des opioïdes ?

L'utilisation de certains médicaments, y compris les antidépresseurs et les opioïdes, en association avec ZYVOXID peut entraîner un syndrome sérotoninergique, une affection potentiellement mortelle (voir rubrique 2 « Autres médicaments et ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé » et rubrique 4).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ce médicament si vous :

- êtes âgé(e)
- présentez facilement des bleus et saignez facilement
- souffrez d'anémie (présentez un faible taux de globules rouges)
- êtes sujet aux infections
- avez des antécédents de convulsions
- souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux, en particulier si vous êtes dialysé
- souffrez de diarrhée

Informez votre médecin immédiatement si pendant le traitement vous souffrez de :

- problèmes visuels tels que vision trouble, modifications de la vision des couleurs, difficultés à voir les détails ou réduction de votre champ visuel.
- perte de sensibilité dans les bras ou les jambes ou sensation de fourmillement ou de picotement dans les bras ou les jambes.
- vous pouvez avoir des diarrhées pendant ou après avoir pris des antibiotiques, y compris ZYVOXID. Si ces diarrhées deviennent graves ou persistantes, ou si vous constatez que vos selles contiennent du sang ou du mucus, vous devez arrêter immédiatement de prendre ZYVOXID et consulter votre médecin. Dans ce cas précis, vous ne devez pas prendre de médicaments qui inhibent ou ralentissent le transit intestinal.
- nausées ou vomissements à répétition, douleur abdominale ou respiration rapide.
- une douleur, une sensibilité ou une faiblesse musculaire inexplicée, et/ou des urines foncées. Ces symptômes peuvent être le signe d'une affection grave appelée rhabdomyolyse (dégradation des muscles), qui peut entraîner des lésions rénales.
- sensation de malaise avec faiblesse musculaire, maux de tête, confusion et troubles de la mémoire pouvant indiquer une hyponatrémie (faibles taux de sodium dans le sang).

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé

Il existe un risque que ZYVOXID puisse parfois interagir avec certains autres médicaments, causant des effets indésirables tels que modification de la pression artérielle, de la température ou du rythme cardiaque.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Informez votre médecin si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines les médicaments suivants car ZYVOXID **ne doit pas** être pris si vous prenez déjà ces médicaments ou les avez pris récemment (voir également la rubrique 2 ci-dessus « Ne prenez jamais ZYVOXID ») :

- inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO par exemple phénelzine, isocarboxazide, sélégiline, moclobémide). Ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson.

Informez aussi votre médecin si vous prenez les médicaments suivants. Votre médecin pourra toujours décider de vous administrer ZYVOXID, mais il devra contrôler votre état de santé général et votre pression artérielle avant et pendant votre traitement. Dans d'autres cas, votre médecin pourra décider qu'un autre traitement convient mieux à votre cas.

- Décongestionnant contre les symptômes du rhume ou de la grippe contenant de la pseudoéphédrine ou de la phénylpropanolamine.
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'asthme tels que salbutamol, terbutaline, fénotérol.
- Certains antidépresseurs de la famille des tricycliques ou des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine). Ces médicaments sont nombreux, incluant amitriptyline, citalopram, clomipramine, dosulépine, doxépine, fluoxétine, fluvoxamine, imipramine, lofépramine, paroxétine, sertraline.
- Médicaments utilisés pour traiter la migraine tels que sumatriptan et zolmitriptan.
- Médicaments utilisés pour traiter les réactions allergiques brutales et sévères tels que l'adrénaline (épinéphrine).
- Médicaments augmentant votre pression artérielle, tels que noradrénaline (norépinéphrine), dopamine et dobutamine.
- Opioïdes, par exemple la péthidine, utilisés pour traiter une douleur modérée à sévère.
- Médicaments utilisés pour traiter les troubles de l'anxiété, tels que la buspirone.
- Médicaments inhibant la coagulation sanguine, tels que warfarine.
- Un antibiotique appelé rifampicine.

ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l'alcool

Vous pouvez prendre ZYVOXID avant, pendant ou après un repas.

Évitez de manger des quantités importantes de fromages affinés, d'extraits de levure ou d'extraits de soja (par exemple sauce de soja) et de boire de l'alcool, en particulier de la bière pression et du vin. ZYVOXID peut en effet réagir avec une substance appelée tyramine qui est naturellement présente dans certains aliments. Cette interaction peut entraîner une élévation de votre pression artérielle.

Si vous développez des maux de tête pulsatiles après avoir mangé ou bu, prévenez immédiatement votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Grossesse, allaitement et fertilité

L'effet de ZYVOXID chez la femme enceinte est inconnu. Il ne doit donc pas être pris au cours de la grossesse sauf si cela est conseillé par votre médecin. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par ZYVOXID car le produit passe dans le lait maternel et pourrait avoir des effets chez le bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ZYVOXID peut entraîner des vertiges ou des troubles de la vision. Dans ce cas, ne conduisez pas de véhicule et n'utilisez pas de machine. Gardez à l'esprit que si vous ne vous sentez pas bien, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé contient du sodium

ZYVOXID contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé de 600 mg, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Adultes

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

La dose recommandée est d'un comprimé pelliculé (600 mg de linézolide) deux fois par jour (toutes les douze heures). Avalez le comprimé pelliculé entier avec de l'eau.

Si vous êtes sous dialyse rénale, vous devez prendre ZYVOXID après votre séance de dialyse.

Le traitement dure habituellement 10 à 14 jours mais peut durer jusqu'à 28 jours. La tolérance et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été établies pour des périodes de traitement supérieures à 28 jours. Votre médecin décidera de la durée de votre traitement.

Au cours du traitement par ZYVOXID, votre médecin surveillera régulièrement votre formulation sanguine en réalisant des tests sanguins.

Votre médecin devra surveiller votre vue si vous êtes traité par ZYVOXID pendant plus de 28 jours.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

ZYVOXID n'est normalement pas utilisé pour traiter les enfants et les adolescents (moins de 18 ans).

Si vous avez pris plus de ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé

Prenez le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Prenez le comprimé pelliculé suivant 12 heures après et continuez à prendre vos comprimés pelliculés toutes les 12 heures. **Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.**

Si vous arrêtez de prendre ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé

Sauf si votre médecin vous demande d'arrêter le traitement, il est important de continuer à prendre ZYVOXID.

Si vous arrêtez le traitement et que vos symptômes originels réapparaissent, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Prévenez immédiatement votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien si vous remarquez l'un de ces effets indésirables au cours de votre traitement par ZYVOXID :

Les effets indésirables graves (dont la fréquence est entre parenthèses) de ZYVOXID sont :

- Problèmes de peau graves (peu fréquent), œdème en particulier autour du visage et du cou (peu fréquent), sifflement et/ou difficultés à respirer (rare). Il peut s'agir d'un signe de réaction allergique et il peut être nécessaire que vous arrêtez de prendre ZYVOXID. Réactions cutanées telles qu'une éruption violacée surélevée due à une inflammation des vaisseaux sanguins (rare), rougeur de la peau avec douleur et desquamation de la peau (dermatite) (peu fréquent), éruption (fréquent), démangeaisons (fréquent).
- Problèmes visuels (peu fréquent) tels que vision trouble (peu fréquent), modifications de la vision des couleurs (fréquence indéterminée), difficultés à voir les détails (fréquence indéterminée) ou réduction de votre champ de vision (rare).
- Diarrhée aiguë, contenant du sang et/ou du mucus (colite associée aux antibiotiques y compris colite pseudomembraneuse), qui peut dans de rares cas s'accompagner de complications pouvant potentiellement menacer le pronostic vital (peu fréquent).
- Nausées ou vomissements à répétition, douleur abdominale ou respiration rapide (rare).
- Syndrome sérotoninergique (fréquence indéterminée) : des convulsions ou des crises d'épilepsie (peu fréquent) ont été rapportées avec ZYVOXID. Si vous constatez une agitation, une confusion, un délire, une rigidité, des tremblements, une incoordination, des convulsions, un rythme cardiaque rapide, des problèmes respiratoires graves et une diarrhée (évocateurs d'un syndrome sérotoninergique) pendant que vous prenez des antidépresseurs de type inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine (ISRS) ou des opioïdes, parlez-en à votre médecin (voir rubrique 2).
- Saignements ou bleus inexpliqués, qui peuvent être dus à des modifications du nombre de certaines cellules sanguines qui peuvent avoir un effet sur la coagulation sanguine ou entraîner une anémie (fréquent).
- Modifications du nombre de certaines cellules sanguines pouvant affecter votre capacité à combattre les infections (peu fréquent). Parmi les signes d'infection : toute fièvre (fréquent), mal de gorge (peu fréquent), ulcères de la bouche (peu fréquent) et fatigue (peu fréquent).

- Rhabdomyolyse (rare) : Les signes et symptômes comprennent une douleur, une sensibilité ou une faiblesse musculaire inexplicée, et/ou des urines foncées. Il peut s'agir des signes d'une affection grave appelée rhabdomyolyse (dégradation des muscles), qui peut entraîner des lésions rénales.
- Inflammation du pancréas (peu fréquent).
- Convulsions (peu fréquent).
- Accidents ischémiques transitoires (trouble temporaire du flux sanguin cérébral entraînant des symptômes à court terme tels que perte de la vue, faiblesse des bras ou des jambes, trouble de la parole et perte de conscience) (peu fréquent).
- Bourdonnements, sifflements dans les oreilles (acouphènes) (peu fréquent).

Un engourdissement, des picotements ou une vision trouble ont été rapportés chez des patients qui ont pris ZYVOXID pendant plus de 28 jours. Si vous présentez des troubles de la vision, vous devez consulter votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables incluent :

Fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Infections fongiques, en particulier vaginales ou buccales (« muguet »).
- Maux de tête.
- Goût métallique dans la bouche.
- Diarrhée, nausées ou vomissements.
- Modifications des résultats de certains examens sanguins, en particulier ceux mesurant les protéines, sels ou enzymes qui évaluent votre fonction rénale ou hépatique ou votre niveau de sucre dans le sang.
- Troubles du sommeil.
- élévation de la pression artérielle.
- Anémie (faible taux de globules rouges).
- Sensation vertigineuse.
- Douleur abdominale localisée ou généralisée.
- Constipation.
- Indigestion.
- Douleur localisée.
- Diminution du taux de plaquettes.

Peu fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Inflammation du vagin ou de la région génitale chez la femme.
- Sensations telles que picotement ou engourdissement.
- Langue enflée, douloureuse ou anormalement colorée.
- Bouche sèche.
- Besoin d'uriner plus fréquent.
- Frissons.
- Sensation de soif.
- Hypersudation.
- Hyponatrémie (faibles concentrations sanguines en sodium).
- Insuffisance rénale.
- Ballonnement abdominal.
- Augmentation de la créatinine.
- Douleur à l'estomac.
- Modification de la fréquence cardiaque (par exemple, augmentation de la fréquence).
- Réduction du nombre des cellules sanguines.
- Faiblesse et/ou modifications sensorielles.

Rares (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 1000) :

- Coloration superficielle des dents pouvant être éliminée par un nettoyage dentaire professionnel (détartrage manuel).

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés (fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- Alopécie (chute de cheveux).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou la plaquette après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé

- La substance active est :

Linézolide 600,00 mg

Pour un comprimé pelliculé

- Les autres composants sont :

Comprimé nu : amidon de maïs (dérivé du maïs), cellulose microcristalline (E460), hyprolose (E463), carboxyméthylamidon sodique (type A) (voir rubrique 2 « ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé contient du sodium »), stéarate de magnésium (E572).

Pelliculage : hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), macrogol 400, cire de carnauba (E903).

Qu'est-ce que ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de ZYVOXID 600 mg sont blancs, de forme ovale et avec « ZYV » gravé sur une face et « 600 » sur l'autre.

Les comprimés pelliculés de ZYVOXID sont conditionnés en plaquettes et en boîtes de 10, 14, 20, 30, 50, 60 ou 100 comprimés pelliculés. Ils sont également disponibles en flacon blanc (PEHD) avec un bouchon à vis (polypropylène) contenant 10, 14, 20, 24, 30, 50, 60 ou 100 comprimés pelliculés (uniquement pour l'usage hospitalier).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

PFIZER HOLDING FRANCE

23-25 AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE
75014 PARIS

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

PFIZER

23-25 AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE
75014 PARIS

Information médicale : Tél. + 33 (0)1 58 07 34 40

Fabricant

PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GmbH
MOOSWALDALLEE 1
79108 FREIBURG IM BREISGAU
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Nom du médicament	Pays
Zyvox	Irlande, Malte
Zyvoxid	Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Octobre 2024.

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Conseil d'éducation sanitaire :

QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1. N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.**
- 2. Respectez strictement votre ordonnance.**
- 3. Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.**
- 4. Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**
- 5. Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.**