

Pfizer

23-25, avenue du Docteur Lannelongue
F-75668 Paris Cedex 14
Tél : (33) (0)1 58 07 30 00

Information destinée aux pharmaciens hospitaliers

Rupture de stock de la spécialité FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion (CIP 34009 335 877 1 0)

Report possible vers la spécialité FARMORUBICINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion (CIP 34009 335 878 8 8)

Paris, le 25 février 2025

Madame, Monsieur, Chère Consœur et Cher Confrère,

Nous souhaitons vous informer qu'une rupture de stock surviendra à partir du 14 mars pour notre spécialité :

FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion
(chlorhydrate d'épirubicine)
Boîte de 1 flacon en verre – CIP 34009 335 877 1 0

Le lot en cours de distribution arrive à péremption au 31 mars 2025, et la date de remise à disposition de FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion n'est pas confirmée à ce jour.

Les indications thérapeutiques de **FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion** sont limitées à :

- carcinomes mammaires,
- cancers de l'ovaire,
- lymphomes malins non hodgkiniens, maladie de Hodgkin,
- cancers bronchiques à petites cellules,
- sarcomes des parties molles,
- cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, cancers hépatocellulaires,
- cancers épidermoïdes de la sphère oto-rhino-laryngologique

Dans ce contexte, Pfizer, en accord avec l'ANSM, souhaite vous informer de la possibilité de l'utilisation de la spécialité **FARMORUBICINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion (CIP 34009 335 878 8 8)** en alternative à la spécialité **FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion (CIP 34009 335 877 1 0)**

Cependant nous souhaitons attirer votre attention sur les modalités de reconstitution de **FARMORUBICINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion** :

Nom de la spécialité	FARMORUBICINE 10 mg poudre pour solution pour perfusion CIP 34009 335 877 1 0	FARMORUBICINE 50 mg poudre pour solution pour perfusion CIP 34009 335 878 8 8
Présentation	Flacon (verre) contenant 10 mg de chlorhydrate d'épirubicine	Flacon (verre) contenant 50 mg de chlorhydrate d'épirubicine
Mode d'administration	<p>La solution doit être reconstituée à l'aide de 5 ml d'eau pour préparations injectables ou de solution isotonique de chlorure de sodium.</p> <p>La solution doit être reconstituée à l'aide de 25 ml d'eau pour préparations injectables ou de solution isotonique de chlorure de sodium.</p> <p>Administration intraveineuse stricte.</p> <p>La reconstitution du produit, quel que soit le solvant précité utilisé, est généralement très rapide (moins de 15 secondes) et ne nécessite pas d'agitation.</p> <p>Injection lente dans la tubulure d'une perfusion intraveineuse de solution de glucose isotonique.</p> <p>Le délai d'injection est généralement compris entre 3 et 20 minutes (selon la dose et le volume de la perfusion) pour minimiser les risques de thrombose ou d'extravasation. Une injection directe en bolus n'est pas recommandée en raison du risque d'extravasation, qui peut survenir même en présence d'un retour sanguin adéquat à l'aspiration.</p> <p>Attention : Il est extrêmement important de s'assurer que l'administration est intraveineuse. Toute extravasation risquerait de produire une nécrose des tissus environnants. En cas d'extravasation, l'administration sera interrompue immédiatement.</p>	

Information médicale

Pour tout complément d'information, vous pouvez nous contacter au : 01 58 07 34 40 ou sur www.pfizermedicalinformation.fr.

Déclaration des effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur signalement.social-sante.gouv.fr/.

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donneespublique.medicaments.gouv.fr



Nous vous prions de bien vouloir relayer cette information aux professionnels de santé concernés ainsi qu'auprès des services avec lesquels vous collaborez.

Conscients des désagréments causés par cette situation, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de notre considération distinguée.

Franck Le Breguero
Pharmacien Responsable