

Carte Patiente

WELIREG® ▼ (belzutifan)

- Ne prenez pas WELIREG pour la maladie de von Hippel-Lindau si vous êtes enceinte.
- Si vous êtes enceinte et avez besoin d'un traitement pour un Carcinome à Cellule Rénales (CCR), parlez à votre médecin de l'utilisation de WELIREG.
- WELIREG peut nuire au bébé et provoquer une fausse couche. Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'avoir un bébé, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Votre médecin effectuera un test de grossesse avant que vous ne commenciez à prendre WELIREG.
- Vous ne devez pas tomber enceinte pendant que vous prenez WELIREG.



70120066/00-2
3331

Méthodes de contraception

- Si vous êtes une femme susceptible de tomber enceinte :
 - . Les méthodes de contraception contenant des hormones, comme les pilules contraceptives, les injections ou les patchs transdermiques, peuvent ne pas fonctionner aussi bien pendant que vous prenez WELIREG.
 - . Pendant que vous prenez WELIREG et pendant au moins 1 semaine après votre dernière dose, vous devez :
 - Utiliser une forme efficace de contraception non hormonale ou
 - Utiliser un préservatif avec votre partenaire masculin.
- Parlez à votre médecin ou pharmacien des méthodes de contraception qui pourraient vous convenir pendant que vous prenez WELIREG.
- Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte ou pensez l'être pendant le traitement.

Pour plus d'informations, consultez la notice de WELIREG qui contient les informations pour le patient.

Coordonnées importantes

Nom du Médecin _____

Téléphone du Bureau _____

Téléphone après les heures de

Bureau _____

Mon Nom _____

