

BURINEX 2 mg/4 ml sol inj en ampoule IV (BUMETANIDE) : Tension d'approvisionnement

A l'attention des pharmaciens d'officine,

Chaponnay, le 13 août 2025

Chère Consœur et cher Confrère,

En raison de tensions d'approvisionnement de la spécialité **BURINEX 2 mg/4 ml sol inj en ampoule IV (BUMETANIDE)** et en accord avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), après accord du médecin prescripteur et sur présentation d'une nouvelle ordonnance, il est recommandé, dans la mesure du possible, de recourir aux alternatives suivantes :

- **Formes orales de BURINEX, dont la biodisponibilité est très proche de celle de la forme IV (80 à 95%)¹, avec un pic sérique survenant en 30 minutes :**

BURINEX 1 mg, comprimé — CIP : 34009 329 396 5 7

BURINEX 5 mg, comprimé — CIP : 34009 345 213 9 3

Lorsque le recours à une forme orale est impossible, le furosémide injectable peut également être utilisé.

Pour toute demande d'information complémentaire, déclaration de cas de pharmacovigilance ou réclamation qualité, vous pouvez contacter nous contacter au numéro gratuit suivant :

01 81 79 38 34

En cas de situation impérieuse, où vous devriez vous procurer **BURINEX 2 mg/4 ml sol inj en ampoule IV (BUMETANIDE)** en urgence, nous vous informons qu'un stock de dépannage est disponible **pour les officines**, et peut être mobilisé si nécessaire. Le **service SOS officine** est à votre disposition et vous permet de vous procurer le produit rapidement.

Vous pourrez transmettre votre commande de dépannage à notre service SOS officine en composant le numéro suivant :

09 72 72 23 61

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation et vous assurons faire tout ce qui est possible pour réduire le délai de remise à disposition de nos médicaments.

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous présentons nos confraternelles salutations.

Xavier NEEL
Pharmacien Responsable Intérimaire

Déclaration des effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre centre régional de pharmacovigilance ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>.

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.



1. Davies DL, Lant AF, Millard NR et al. Renal action, therapeutic use, and pharmacokinetics of the diuretic bumetanide. Clin Pharmacol and Ther, 1974; 15: 141-155 Murdoch WR, Auld WHR. Bumetanide – acute and long term studies of a new high potency diuretic. Postgrad Med J 1975; 51 (6): 64-69
Alloga, Europrogramme, 40, Boulevard de Dunkerque
CS 41221 - 13471 Marseille cedex 02