

PENTHROX[®]

(méthoxyflurane, liquide pour inhalation par vapeur de 3 mL)

A vérifier avant l'administration

INFORMATIONS IMPORTANTES DE RÉDUCTION DU RISQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS DES SITUATIONS D'URGENCE MÉDICALE

Cette liste est essentielle pour assurer une utilisation correcte du méthoxyflurane et une gestion appropriée des risques. Avant d'utiliser du méthoxyflurane **A VÉRIFIER!** s'il vous plaît :

NE PAS administrer du méthoxyflurane si le patient présente un de ces risques

- A** Agés de moins de 6 ans
- V** Ventilation (dépression respiratoire)
- É** État de conscience altéré (y compris dû à traumatisme crânien, drogue, alcool)
- R** Rein (atteinte rénale cliniquement significative)
- I** Interaction médicamenteuse (voir au verso)
- F** Foie (antécédent de toxicité hépatique avec le méthoxyflurane ou avec des anesthésiques halogénés)
- I** Instabilité cardiovasculaire
- É** Élévation de la température (hyperthermie maligne connue ou prédisposition génétique)
- R** Réaction d'hypersensibilité connue au méthoxyflurane ou à l'un des excipients
- !** Administration : ne pas dépasser 2 flacons par administration et 5 flacons par semaine

Expliquez au patient les instructions pour une bonne administration de PENTHROX®

RAPPEL

- Veuillez lire le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et remettre au patient et à la personne qui l'accompagne la notice d'information.
Ces informations sont disponibles également sur: <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>
- Veillez à administrer la dose antalgique efficace la plus faible et à ce que la dose maximale de 6 mL ne soit pas dépassée (soit 2 flacons par administration).

ASSOCIATIONS À ÉVITER

- Inducteurs enzymatiques du CYP 450 (exemples : alcool, isoniazide, phénobarbital, rifampicine, carbamazépine, éfavirenz, ou névirapine)
- Médicaments connus pour avoir un effet néphrotoxique (exemples: produits de contraste ou certains antibiotiques tels que tétracycline, gentamicine, colistine, polymyxine B ou amphotéricine B).
- Sévoflurane en anesthésie (augmentation des concentrations sériques des ions fluorure associés à la néphrotoxicité du méthoxyflurane).

L'utilisation concomitante du méthoxyflurane avec des dépresseurs du Système Nerveux Central (SNC) peut augmenter les effets dépresseurs, les patients doivent faire l'objet d'une surveillance étroite.

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr> Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr>

® PENTHROX est une marque enregistrée de Medical Developments International Limited.



Information Médicale et Pharmacovigilance :

Tél. France et Outre-Mer **0 800 535 176** Service à appel gratuits

Tél. France ou depuis l'étranger **(+33) 1 41 12 65 63**

Pour plus d'informations : infomed@ethypharm.com

Laboratoires Ethypharm S.A.S.U - Capital 677 296 € - 572 228 534 RCS Nanterre

LABORATOIRES ETHYPHARM

179, Bureaux de la Colline

92213 Saint-Cloud cedex

Tél. : +33 (0)1 41 12 17 00

Fax : +33 (0)1 41 12 17 01

www.ethypharm.fr