GLENWOOD

GLENWOOD GMBH Pharmazeutische Erzeugnisse



Mitry Mory, le 25 septembre 2025

<u>Lettre d'information aux</u> pharmaciens hospitaliers, radio pharmaciens, médecins spécialisés en cardiologie et radiologie et médecins nucléaires

Mise à disposition de PERSANTIN 10 mg/2 mL, soluzione per infusione on injectable, en remplacement de PERSANTINE 10 mg/2ml solution injectable, ampoule Code CIP : 34009 562 340 9 7

Madame, Monsieur, chère confrère, chère consœur,

Afin de répondre aux besoins d'approvisionnement dans le contexte de forte tension d'approvisionnement de la spécialité PERSANTINE 10 mg/2ml solution injectable, ampoule, le laboratoire Eurodep Pharma met à disposition, en accord avec l'ANSM, sous forme d'importation à titre exceptionnel et dérogatoire, des unités de la spécialité PERSANTIN 10 mg/2ml, soluzione per infusione on injectable destinées initialement à l'Italie.

Les unités italiennes sont conformes en termes de procédés de fabrication, libération et contrôle, au dossier d'AMM enregistré en France. Ils ont été fabriqués et contrôlés sur le même site de fabrication que la spécialité française.

Le tableau ci-dessous mentionne les principales différences entre la spécialité française et italienne :

Points	d'attention majeurs en tern	nes d'étiquetage
	Spécialité française en tension	Spécialité italienne de remplacement
Nom de la spécialité	PERSANTINE 10 mg/2 ml, solution injectable, ampoule	PERSANTIN 10 mg/2 ml soluzione per infusione
	CONDITIONNEMENT SECONDAIRE	
Langue utilisée	Français	Italien
Pictogramme grossesse	OUI : PERSANTINE + GROSSESSE = DANGER	NON précisé mais applicable Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le dipyridamole pendant la grossesse, particulièrement pendant le premier trimestre, à moins que le bénéfice attendu soit supérieur au risque pour le fœtus
Pictogramme conduite automobile	OUI	NON précisé mais applicable

Langue utilisée	Français	Italien
	NOTICE	
DCI	Dipyridamole	Dipiridamolo
Nature du conditionnement	Identique : Ampoule en verre transparent sous blister (2 blisters de 5 ampoules)	
Langue utilisée	Français	Italien
	CONDITIONNEMENT PRIMAIRE	
Précautions particulières de conservation	Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Conserver le produit à l'abri de la lumière. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants	En complément, il est ajouté sur la persantin Italie : Les solutions prêtes à l'emploi ne peuvent être conservées plus de 8 heures. La date de péremption indiquée se réfère au produit dans son emballage intact, correctement conservé.
Liste des excipients	Identique : Excipients : Acide tartrique, Acide chlorhydrique, Polyéthylène glycol 600, Eau pour préparations injectables	
Dosage et voie d'administration	Identique : 10 mg de Dipyridamole pour une ampoule de 2 mL Administration par perfusion I.V.	
Nombre d'unités	Identique : 10 ampoules autocassables de 2 mL	

Nous vous rappelons que par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le dipyridamole pendant la grossesse, particulièrement pendant le premier trimestre, à moins que le bénéfice attendu soit supérieur au risque pour le fœtus. Par ailleurs, les patients doivent être informés qu'ils peuvent ressentir des effets indésirables tels que des sensations vertigineuses lors de l'administration de PERSANTINE. Par conséquent, une prudence particulière est recommandée lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces PERSANTIN en provenance d'Italie ont une péremption en janvier 2026, plus courte que celle des spécialités PERSANTINE 10mg/2mL France éventuellement encore en votre possession. Eurodep Pharma assurera de la même manière que pour la PERSANTINE 10mg/2 ml France la responsabilité de son exploitation en France, notamment en ce qui concerne la pharmacovigilance, l'information médicale et les réclamations qualité.

Nous vous rappelons que la spécialité importée n'est pas rétrocédable.

Ces unités importées ne seront pas décommissionnées, celles-ci ne comportant pas de numéros de série.

Marc LIBEAU, pharmacien responsable

