

COORDONNÉES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nom de mon médecin :

Numéro de téléphone de mon médecin :

Autre contact hospitalier :

Numéro de téléphone de ce contact :

En dehors des heures d'ouverture :

Certains effets indésirables peuvent sembler banals mais peuvent être graves et être encore plus sévères s'ils ne sont pas pris en charge correctement par votre médecin.

C'est pourquoi vous ne devez pas attendre et l'appeler immédiatement si un ou des effets indésirables de la liste au verso de la carte apparaissent.

N'essayez pas de traiter vous-même ce(s) symptôme(s) avec d'autres médicaments.

Informations importantes pour les patients

- Le trémélimumab peut provoquer **des effets indésirables graves**.
- Ces effets indésirables peuvent survenir des semaines ou des mois après l'arrêt du traitement.
- **Contactez immédiatement votre médecin** si vous ressentez un ou plusieurs des effets indésirables listés au verso de cette carte pour en discuter avec lui.
- Pour plus d'informations, lisez la notice patient.
- Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel de santé que vous consultez.
- Gardez cette carte sur vous à tout moment.

Informations importantes pour les professionnels de la santé

- Ce patient est traité par IMJUDO (trémélimumab), qui est associé à des effets indésirables à médiation immunitaire pouvant être graves.
- Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire les complications pouvant potentiellement menacer le pronostic vital.
- Une consultation avec un oncologue ou le médecin du patient facilite donc la prise en charge des effets indésirables à médiation immunitaire.

Diffusée sous l'autorité de l'ANSM

Carte Patient IMJUDO (trémélimumab)

Solution à diluer pour perfusion 20 mg/mL

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

AstraZeneca 

Version 4
Août 2025
FR-23640 – 08/2025

Contactez immédiatement votre médecin si vous avez un ou des symptômes de la liste suivante :

Symptômes possibles

POITRINE

- Apparition ou aggravation d’une toux ; essoufflement ; douleur dans la poitrine
- Difficulté à respirer, respiration rapide et profonde ou sifflante
- Battements de cœur irréguliers ou rapides

MUSCLES ET ARTICULATIONS

- Douleur musculaire ou raideurs ou faiblesse ou fatigue rapide des muscles
- Fourmillements ou engourdissements des bras ou des jambes ; douleurs ; faiblesse ou paralysie des mains, pieds ou bras
- Douleurs articulaires, gonflement et/ou raideur

ESTOMAC ET INTESTINS

- Envie de vomir (nausées) ou vomissements
- Douleur dans le côté droit de votre estomac ; douleur ou sensibilité sévère à l’estomac
- Constipation
- Diarrhée ou selles plus fréquentes qu’en temps normal ; selles noirâtres, goudronneuses ou collantes contenant du sang ou des glaires
- Goût sucré ou métallique dans la bouche, haleine à l’odeur sucrée
- Maladie coéliqua (caractérisée par des symptômes tels que des douleurs à l’estomac, une diarrhée et des ballonnements après la consommation d’aliments contenant du gluten)

PEAU

- Jaunissement de la peau ou rougeur de la peau
- Chute des cheveux
- Éruption cutanée et/ou démangeaisons, ampoules, ulcères dans la bouche ou d’autres muqueuses
- Bleus sur la peau plus faciles que normalement
- Transpiration la nuit ou odeur différente de la sueur

YEUX

- | | |
|--|------------------------------|
| - Hypersensibilité des yeux à la lumière | - Rougeur des yeux |
| - Jaunissement du blanc des yeux | - Douleur au niveau des yeux |
| | - Modification de la vision |

GÉNÉRAL

- | | |
|---|--|
| - Fièvre | - Sang dans les urines ou urines foncées ou à l’odeur inhabituelle |
| - Maux de tête persistants ou inhabituels | - Besoin d’uriner plus fréquent qu’en temps normal ; diminution de la quantité urinée |
| - Confusion, frissons, tremblements, raideur de la nuque, convulsions | - Baisse de l’appétit ou au contraire sensation de faim ou de soif plus importante qu’en temps normal |
| - Sensation vertigineuse ou de froid | - Taux élevé du sucre dans le sang |
| - Fatigue extrême | - Absence ou réduction des enzymes digestives produites par le pancréas (insuffisance pancréatique exocrine) |
| - Évanouissement | |
| - Prise ou perte de poids | |
| - Somnolence | |
| - Saignements | |

Si vous avez un ou des symptômes de la liste ci-dessus contactez immédiatement votre médecin sans avoir peur de le déranger.

- Les symptômes peuvent sembler bénins, mais ils **peuvent être graves** et être encore plus sévères s’ils ne sont pas pris en charge correctement par votre médecin.
- Contactez aussi votre médecin si vous avez le moindre doute ou une question.
- Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>.