



GUIDE **PATIENT/AIDANT**

Ce guide contient des informations de sécurité importantes concernant votre traitement par SCYOVA®.

Veuillez conserver ce guide pendant toute la durée de votre traitement.

Ce document est diffusé sous l'autorité de l'ANSM.

Introduction

- Votre médecin vous a prescrit le médicament SCYOVA® pour le traitement de votre maladie de Parkinson.
- Vous ou votre aidant devrez être formés à la manipulation du produit et de la pompe de perfusion avant utilisation.
- Ce médicament s'administre par perfusion sous-cutanée : sous votre peau à l'aide d'une pompe de perfusion dans une zone dédiée au site de perfusion au niveau de l'abdomen.
- Ce médicament sera administré de façon continue pendant 24 heures, par l'intermédiaire de cette pompe.

Certaines personnes utilisant ce médicament peuvent présenter des problèmes cutanés au niveau du site de perfusion.

Il peut s'agir des problèmes suivants :

- **une infection de la peau.** Elle se produit lorsque des germes pénètrent dans la peau. Une infection de la peau peut devenir grave si des germes pénètrent dans le sang et se propagent dans tout le corps. On parle alors de septicémie.

- **une réaction cutanée.** Elle se produit lorsque la peau devient irritée/inflammée.

Les informations clés à retenir :



Comment choisir votre site de perfusion ?



Comment reconnaître une infection ou une réaction au site de perfusion ?



Ce que vous pouvez faire pour réduire le risque d'infection ou de réaction au site de perfusion



Ce que vous devez faire en cas d'infection ou de réaction au site de perfusion



Où vous pouvez trouver davantage d'informations au sujet de votre médicament ?




Comment choisir votre site de perfusion ?

- Il est important de changer régulièrement votre site de perfusion. Cela permet à votre peau de rester saine et au médicament d'être administré correctement.
- Vous devez utiliser votre abdomen comme site de perfusion, à moins que votre médecin ne vous indique d'utiliser une autre zone. Assurez-vous de choisir un site qui se situe à au moins 5 cm (environ la longueur de votre petit doigt) de votre nombril.

- Évitez la zone au niveau de la ceinture car celle-ci peut être irritée par la pression de la ceinture contre la peau.
- Évitez toute zone de peau cicatrisée ou présentant des vergetures, tout tissu durci.
- Évitez également les plis cutanés, là où votre peau se plie naturellement beaucoup.
- Utilisez un nouveau set de perfusion (canule/tubulure) chaque fois que vous changez de site de perfusion.

- Changez de site de perfusion tous les 3 jours ou plus souvent que tous les 3 jours si vous observez des changements cutanés (par exemple : une rougeur, un gonflement et/ou une douleur).
- Le nouveau site de perfusion choisi doit se situer à au moins 2,5 cm (environ l'espace de deux doigts) du précédent site utilisé.
- Une fois que vous avez choisi un site de perfusion, ne le réutilisez plus pendant 12 jours. Cela permettra à votre peau de cicatriser complètement.

- Il existe différentes façons de vous rappeler de ne pas réutiliser un site de perfusion trop tôt. L'une d'elles est de visualiser votre abdomen comme une horloge. À chaque changement de canule, vous décalez le site de perfusion en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre comme sur le plan ci-dessous. Si vous commencez avec un site à 12h, le suivant peut être celui situé à 2h, le suivant celui situé à 4h, et ainsi de suite.




Notez la date et l'emplacement de vos sites de perfusion à chaque changement, afin de vous aider dans le suivi de l'administration.



Comment reconnaître une infection ou une réaction au site de perfusion ?

Soyez attentifs devant tout changement cutané, là où la canule pénètre dans votre peau. Les changements cutanés peuvent survenir avec ou sans fièvre et comprendre les symptômes suivants :

- Rougeur
- Sensation de chaleur au toucher
- Gonflement
- Sensibilité/douleur
- Décoloration de la peau lorsque vous appuyez dessus



Ce que vous pouvez faire pour réduire le risque d'infection ou de réaction au site de perfusion

Des infections ou des réactions peuvent survenir au site de perfusion. Voici les éléments à prendre en compte lors de la perfusion :

- Utilisez un endroit bien éclairé, propre et à plat (comme une table) pour préparer votre perfusion.
- Lavez-vous toujours les mains avec de l'eau et du savon, puis séchez-les avec une serviette en papier. Ne touchez aucun objet sale après cela.
- Jetez avec précaution tout matériel utilisé qui pourrait être contaminé.
- Gardez le site de perfusion et le set de perfusion (canule + tubulure) propres et stériles pendant que vous préparez la perfusion.
- Évitez de laisser l'embout de la seringue, l'adaptateur du flacon, la tubulure ou la canule toucher une surface sale.
- Une fois que vous avez choisi un site de perfusion, essuyez votre peau avec tampon ou compresse alcoolisé(e). Assurez-vous d'essuyer toujours dans une seule direction afin de ne pas contaminer la zone nettoyée. Laissez la zone sécher pendant au moins 1 minute.

Changez de site de perfusion tous les 3 jours ou plus souvent que tous les 3 jours si vous observez des changements cutanés (par exemple : une rougeur, un gonflement et/ou une douleur).



Ce que vous pouvez faire pour réduire le risque d'infection ou de réaction au site de perfusion



- Lorsque vous choisissez un nouveau site de perfusion, ne sélectionnez pas un site précédemment utilisé au cours des 12 derniers jours. Cela permettra à votre peau de cicatriser complètement.
- Utilisez toujours une nouvelle canule et une nouvelle tubulure lorsque vous changez de site de perfusion.
- Portez des vêtements confortables qui n'irritent pas votre peau au site de perfusion.
- Gardez toujours une distance d'au moins 2,5 cm (environ l'espace de deux doigts) avec le dernier site de perfusion utilisé.
- Coupez les poils autour du site de perfusion avec des ciseaux. Cela permettra à la bande adhésive de la canule d'adhérer à votre peau. Si vous devez vous raser la peau, attendez un jour avant d'utiliser la zone comme site de perfusion.



Ce que vous devez faire en cas d'infection ou de réaction au site de perfusion

Changez de site de perfusion, n'attendez pas 3 jours. Appelez votre médecin, votre infirmier(ère) ou votre pharmacien(ne) si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- **Rougeur**
- **Sensation de chaleur au toucher**
- **Gonflement**
- **Sensibilité / douleur**
- **Décoloration de la peau lorsque vous appuyez dessus**



Avant de réutiliser un site de perfusion qui a été infecté : attendez au moins 12 jours (ou attendez que le site soit complètement guéri).



Où trouver davantage d'informations sur votre médicament ?

- Pour plus d'informations sur votre médicament, consultez la notice d'information dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments à l'adresse suivante :

<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Ou en flashant le QR code correspondant :



- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier(ère). Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Pour plus d'information, consulter la rubrique "Déclarer un effet indésirable" sur le site internet de l'ANSM :

<http://ansm.sante.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Notes

Les données personnelles collectées par AbbVie dans le but de gérer les interactions avec les professionnels de santé sont soumises à la Politique de confidentialité d'AbbVie du pays de résidence du professionnel de santé. Les politiques de confidentialité mondiales d'AbbVie sont disponibles à l'adresse <https://privacy.abbvie/privacy-policies.html>. Chacune d'entre elles contient des informations supplémentaires sur les pratiques d'AbbVie en matière de confidentialité pour les professionnels de santé, le responsable du traitement des données d'AbbVie et la manière dont les professionnels de santé peuvent exercer leurs droits en matière de confidentialité des données.

AbbVie

SAS à associé unique au capital de 133 449 467,40 €
RCS Nanterre 750 775 660
Siège Social : 5/13 boulevard de la République
92100 Boulogne-Billancourt

