

Information destinée aux patients

le 30 janvier 2026,

Objet : Tension d’approvisionnement de la spécialité NEXPOVIO 20 mg, comprimé pelliculé (sélinexor), présentation boîte de 12 comprimés conditionnés en 4 plaquettes de 3 comprimés : modification temporaire de la délivrance des plaquettes dosées à 60mg : risque d’erreur médicamenteuse (surdosage)

Madame, Monsieur,

En raison d’une tension d’approvisionnement momentanée rencontrée sur la boîte de NEXPOVIO 60mg (12 comprimés conditionnés en 4 plaquettes de 3 comprimés de selinexor 20 mg par comprimé pelliculé), (60 mg de sélinexor par prise hebdomadaire représente une plaquette complète de 3 comprimés à prendre en une fois), **votre pharmacien vous a dispensé une boîte de NEXPOVIO 80 mg (16 comprimés conditionnés en 4 plaquettes de 4 comprimés (soit 80 mg de sélinexor par plaquette), soit 1 comprimé de plus par plaquette (au lieu des 3 comprimés habituels à prendre par semaine).**

Nous souhaitons attirer votre attention sur cette différence de présentation entre les 2 médicaments.

NEXPOVIO 20 mg, comprimé pelliculé (sélinexor)	
Présentation en tension 60 mg	Présentation de remplacement 80 mg
Boîte 12 comprimés conditionnés en 4 plaquettes de 3 comprimés suremballées	Boîte 16 comprimés conditionnés en 4 plaquettes de 4 comprimés suremballées
<p align="center">Plaquette => 3 comprimés par plaquette</p>	<p align="center">Plaquette => 4 comprimés par plaquettes</p> <p align="center">Attention : Prenez seulement 3 comprimés par plaquette , comme habituellement, en laissant le dernier comprimé dans la plaquette</p>
Chaque plaquette contient 3 comprimés de 20 mg, soit 60 mg de sélinexor au total par plaquette	Chaque plaquette contient 4 comprimés de 20 mg, soit 80 mg de sélinexor au total par plaquette

Chaque plaquette de 80 mg comprend 4 comprimés dosés chacun à 20 mg de sélinexor au lieu des 3 comprimés habituels préconisés (pour une prescription hebdomadaire de 60 mg de sélinexor).

Il est important de respecter la posologie qui vous a été prescrite : Prenez uniquement 3 comprimés de sélinexor par plaquette, à la fréquence habituelle (hebdomadaire) comme défini par votre médecin, en laissant le 4^{ème} comprimé dans la plaquette, pour maintenir votre posologie à 60 mg par semaine.

Si vous avez l'impression que votre médicament n'agit pas comme d'habitude ou si vous ressentez des effets indésirables, ou si vous avez pris un comprimé de plus que prévu (soit la plaquette de 4 comprimés complète) surtout s'ils sont inhabituels ou très intenses, contactez rapidement votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien.

Information médicale

Pour toute question d'information médicale, nous vous invitons à contacter le service d'information médicale de Pharma Blue par téléphone au 01 82 73 24 63 ou par courriel à l'adresse suivante : medinfo@pharma-blue.com

Déclaration des effets indésirables

Déclarez tout effet indésirable et/ou erreur médicamenteuse suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>
Pour plus d'information sur les médicaments, consultez le site de l'ANSM : ansm.sante.fr ou la base de données publique des médicaments : <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations respectueuses.

Laboratoire Menarini Stemline

Laboratoire Pharma Blue