

## Mes coordonnées et celles de mon médecin

Nom du médecin prescripteur

Numéro de téléphone du médecin prescripteur

Numéro de téléphone en dehors des heures d'ouverture

Mon nom

Mon numéro de téléphone

Personne à contacter en cas d'urgence

Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence

Exploitant : Laboratoires LEO  
Tél : +33 1 30 14 40 00

Titulaire : TopAlliance Biosciences Europe Ltd,  
Tous droits réservés.  
[www.topalliancebio.com](http://www.topalliancebio.com)

## Problèmes cardiaques / Cœur (inflammation du muscle cardiaque : myocardite)

- Essoufflement
- Battements de cœur irréguliers
- Fatigue
- Douleur thoracique

## Problèmes à d'autres endroits de votre corps

- Muscles  
(Inflammation des muscles : myosite) : douleur ou faiblesse musculaire  
(Rhabdomyolyse) : raideur des muscles et des articulations, contractures musculaires
  - Yeux (inflammation de l'uvée, la couche sous le blanc du globe oculaire : uvéite) : changements de la vision
  - Pancréas (inflammation du pancréas : pancréatite) : douleur abdominale, nausées, vomissements
  - Vessie (inflammation de la vessie : cystite) : miction douloureuse, présence de sang dans l'urine
  - Articulations (inflammation des articulations : arthrite/arthralgie) : articulations douloureuses, rouges ou gonflées ou lésions articulaires permanentes
  - Système nerveux :  
(Inflammation du cerveau : encéphalite) :

confusion mentale, fièvre, problèmes de mémoire ou convulsions

(Inflammation des nerfs, y compris le syndrome de Guillain-Barré) : faiblesse dans les muscles des bras et des jambes ou des muscles du visage, vision double et fourmillements dans les pieds et les mains

- (Thrombopénie à médiation immunitaire) : diminution du nombre de plaquettes

## Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé [www.signalement.social-sante.gouv.fr](http://www.signalement.social-sante.gouv.fr). Pour plus d'information, consulter la rubrique «Déclarer un effet indésirable» sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Version 1.0, Septembre 2025 Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

## LOQTORZI 240 mg solution à diluer pour perfusion (toripalimab)

### Carte patient

Informations de sécurité importantes afin de réduire les risques d'effets indésirables liés au système immunitaire (à médiation immunitaire) pouvant survenir avec LOQTORZI®

Cette carte d'alerte patient contient des informations de sécurité importantes dont vous devez avoir connaissance avant de commencer le traitement par LOQTORZI®. Des effets indésirables graves, pouvant parfois engager le pronostic vital, peuvent survenir à n'importe quel moment au cours du traitement ou même après l'arrêt du traitement. Vous pouvez présenter plus d'un effet indésirable à la fois.

Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou professionnel de santé. Vous pouvez également consulter la notice « information du patient » de LOQTORZI® disponible sur :

<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou contacter le service d'Information Médicale à l'adresse suivante : Info-Med.fr@leo-pharma.com

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des signes ou symptômes listés ci-dessous. Un traitement médical rapide peut éviter une aggravation de la situation et atténuer les symptômes. Votre médecin pourra vous prescrire d'autres médicaments pour traiter vos symptômes, différer la prochaine dose ou interrompre le traitement par LOQTORZI.

#### Information importante à destination des patients

- Gardez cette carte d'alerte patient sur vous à tout moment pendant la durée du traitement et pendant au moins quatre (4) mois suivant la dernière injection de LOQTORZI.
- Présentez cette carte à tout professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge médicale, y compris en cas de passage aux urgences.

• En cas de questions, consultez votre médecin ou votre infirmier(ère). Ne tentez pas de diagnostiquer ou de traiter les effets indésirables vous-même.

- Cette carte d'alerte patient ne répertorie pas tous les effets indésirables possibles.
- Lisez la notice patient LOQTORZI ou consultez votre médecin pour obtenir des informations complémentaires sur les effets indésirables.

Consultez immédiatement un médecin en urgence si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants, ou s'il s'aggrave :  
**Problèmes pulmonaires / Poumons (inflammation des poumons : pneumopathie)**

- Essoufflement
  - Douleur dans la poitrine ou toux
- Problèmes digestifs / Intestins (inflammation du gros intestin : colite)**
- Diarrhée ou selles plus fréquentes que d'habitude
  - Selles noires, goudronneuses, ou contenant du sang ou du mucus
  - Douleur abdominale intense ou sensibilité accrue de l'estomac

#### Problèmes du foie / Foie (inflammation du foie : hépatite)

- Nausées ou vomissements
- Perte d'appétit
- Douleur au côté droit du ventre
- Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse)
- Urines foncées
- Saignements ou bleus survenant plus facilement que la normale

#### Problèmes au niveau des glandes hormonales (en particulier thyroïde, hypophyse et surrenales)

- Rythme cardiaque rapide
- Perte ou prise de poids
- Augmentation de la transpiration
- Chute des cheveux
- Sensation de froid
- Constipation
- Voix plus grave
- Douleurs musculaires
- Vertiges ou évanouissements
- Maux de tête persistants ou mal de tête inhabituel

#### Diabète de type 1 y compris acidose diabétique (production d'acides dans le sang due au diabète)

- Sensation de faim ou de soif plus importante que d'habitude
- Besoin d'uriner plus fréquent
- Perte de poids
- Sensation de fatigue ou de malaise
- Douleur à l'estomac
- Respiration rapide et profonde
- Somnolence inhabituelle
- HALEINE à l'odeur sucrée, goût sucré ou métallique dans la bouche
- Odeur différente de l'urine ou de la sueur

#### Problèmes rénaux / Reins (inflammation des reins : néphrite)

- Changements de la quantité ou de la couleur de votre urine

#### Problèmes cutanés / Peau (inflammation de la peau)

- Éruption cutanée, démangeaisons, cloques ou desquamation
- Plaies et/ou ulcères dans la bouche ou sur les muqueuses du nez, de la gorge ou de la zone génitale