

Carte Patiente

**Information importante pour les patientes
susceptibles de devenir enceinte**

WELIREG® (belzutifan)



Vous ne devez pas devenir
enceinte pendant que vous
prenez WELIREG.
Si vous êtes enceinte :

- Ne prenez pas WELIREG pour la
maladie de von Hippel-Lindau.
- Parlez à votre médecin de l'utilisation
de WELIREG pour le traitement d'un
Carcinome à Cellule Rénale.
- WELIREG peut nuire au bébé dans votre
utérus et provoquer une fausse-couche.
- Informez immédiatement votre
médecin si vous êtes enceinte, pensez
être enceinte, devenez enceinte ou
souhaitez devenir enceinte, avant et
pendant le traitement par WELIREG.



70125881/00-1
5331

- Votre médecin effectuera un test de
grossesse avant que vous ne
commenciez à prendre WELIREG.

Contraception (prévention de la grossesse)

- Les méthodes de contraception
contenant des hormones - comme les
pilules contraceptives, les injections ou
les patchs transdermiques - peuvent ne
pas fonctionner aussi bien pendant la
prise de WELIREG.
- Utilisez une méthode de contraception
fiable sans hormones ou veillez à ce
que votre partenaire masculin utilise un
préservatif pour prévenir toute grossesse.
Faites-le pendant que vous prenez
WELIREG et pendant au moins 1 semaine
après la dernière prise de WELIREG.
- Parlez à votre médecin ou pharmacien
des méthodes de contraception qui
pourraient vous convenir.

**Lisez attentivement la notice pour plus
d'informations.**

Coordonnées importantes

Mon nom _____

Nom de mon médecin _____

Téléphone du bureau _____