

Votre nom :

Nom de votre médecin  
(qui a prescrit Litfulo) :

Numéro de téléphone du médecin :

Date à laquelle vous avez  
commencé votre traitement :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé  
<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.



PP-LGF-FRA-0110 - Février 2026  
Pfizer, société par actions simplifiée  
au capital de 47 570 €.

Siège social : 23-25 avenue du Dr Lannelongue  
75014 Paris. 433 623 550 RCS Paris.  
Locataire-gérant de Pfizer Holding France.  
TVA Intra : 73 433 623 550.

**Litfulo.**  
(ritlécitinib) gélules  
50 mg



## LITFULO (ritlécitinib) CARTE PATIENT

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

### Informations de sécurité.

- Cette carte contient des informations de sécurité importantes et décrit les signes et symptômes que vous devez connaître afin d'avertir sans délai votre médecin, s'ils apparaissent avant et pendant votre traitement par Litfulo.
- **Lisez attentivement la notice**  
d'information incluse dans chaque boîte de Litfulo ou consultable sur le site de la base de données publiques du médicament : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>
- Si certaines informations ne sont pas claires, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Prenez connaissance des effets indésirables et des rubriques listées ci-après et informez votre médecin de tout effet indésirable

### Risque d'infections

Informez votre médecin ou pharmacien avant et pendant le traitement par Litfulo si vous :

- avez une infection (les signes possibles incluent fièvre, sueurs, frissons, courbatures, toux, essoufflement, sang dans les expectorations, perte de poids, diarrhée, douleur à l'estomac, sensation de brûlure en urinant, besoin d'uriner plus fréquent que d'habitude, sensation de grande fatigue) ;
- avez ou avez eu la tuberculose ou avez été en contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose, ou si vous résidez ou voyagez dans des régions où la tuberculose est très répandue. Votre médecin vous fera effectuer des tests de dépistage de la tuberculose avant de débiter le traitement par Litfulo et pourra répéter les tests au cours du traitement ;

- avez déjà eu une infection par l'herpès (varicelle ou zona), car Litfulo peut favoriser sa réapparition. Informez votre médecin si vous présentez une éruption cutanée douloureuse avec des cloques, car cela peut être un signe de zona.

## Vaccination

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant toute vaccination car certains vaccins (les vaccins vivants atténués comme par exemple le ROR ou les vaccins contre la varicelle, la fièvre jaune) doivent être évités juste avant et pendant le traitement par Litfulo.

## Risque de caillots sanguins dans les veines ou dans les poumons

**Informez votre médecin si vous :**

- avez déjà eu des caillots sanguins dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) ou de vos poumons (embolie pulmonaire).

**Prévenez votre médecin si vous présentez :**

- une jambe douloureuse et gonflée,
- une douleur thoracique ou un essoufflement, car ces symptômes peuvent être des signes de la présence de caillots sanguins dans les veines.

**Informez votre médecin, si vous :**

- avez déjà eu des caillots sanguins dans une artère de l'œil (occlusion rétinienne) ou du cœur (crise cardiaque).

**Prévenez votre médecin si vous présentez :**

- des modifications aiguës de votre vue (vision floue, perte partielle ou complète de la vision),
- une douleur thoracique, un essoufflement, car ces symptômes peuvent être des signes de la présence de caillots sanguins dans les artères.

## Risque de symptômes neurologiques

Interrompez le traitement et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez des symptômes inexplicables en lien avec le système nerveux.

## Risque de cancer

Informez votre médecin si vous avez ou avez eu un cancer. On ignore si Litfulo augmente le risque de cancer, votre médecin identifiera en discutant avec vous si un traitement par ce médicament est approprié et si des contrôles sont nécessaires, notamment des examens réguliers de la peau au cours du traitement.

Informez votre médecin si vous remarquez une nouvelle excroissance sur votre peau.

## Contraception, grossesse et allaitement

**Litfulo ne doit PAS être utilisé pendant la grossesse.**

Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par Litfulo et pendant encore **un mois** après la dernière prise de Litfulo.

Discutez avec votre médecin des méthodes de contraceptions les plus appropriées.

Informez **immédiatement** votre médecin si vous tombez enceinte ou pensez avoir pu tomber enceinte pendant le traitement ou moins d'un mois après son arrêt car Litfulo peut nuire au développement du bébé.

**Conservez toujours cette carte sur vous et montrez-la aux professionnels de santé qui participent à vos soins médicaux (par exemple, votre pharmacien ou un médecin urgentiste).**

**Qu'est-ce que Litfulo et dans quel cas est-il utilisé ?**

La substance active contenue dans Litfulo est le ritlécitinib. Il est utilisé pour traiter la pelade sévère chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus. La pelade est une maladie dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les follicules pileux, provoquant une inflammation qui conduit à une perte de cheveux et de poils sur le visage et/ou d'autres parties du corps.

Litfulo agit en réduisant l'activité des enzymes appelées JAK3 et des kinases de la famille TEC impliquées dans l'inflammation du follicule pileux. Il réduit l'inflammation, entraînant la repousse des cheveux chez les patients atteints de pelade.