



ASOS 2024

Antalgiques Stupéfiants et Ordonnances Sécurisées

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

➔ 498 ordonnances analysées pour 129 pharmacies participantes



ASOS qu'est ce que c'est ?

Une étude nationale d'addictovigilance pour mieux comprendre, encadrer et faire évoluer la prescription des antalgiques stupéfiants en ville.

- 1 500 pharmacies sélectionnées par tirage au sort
- Métropole + Départements d'Outre-Mer
- Étude transversale répétée menée sur 1 semaine tous les ans
- Population cible : Tout patient ayant reçu une dispensation d'antalgiques stupéfiants



ÉCHANTILLON DE L'ETUDE

- ➔ 9,2 % de participation des pharmacies
- ↗ 62 % de femmes ; population âgée en moyenne de 67 ans
- ➔ Grande majorité de patients résidant à domicile (87 %)
- ➔ Médecins généralistes (80 % des prescripteurs)
- ↗ 70 % de renouvellements d'ordonnances



QUELQUES CHIFFRES

En moyenne, 1,6 antalgiques opioïdes stupéfiants prescrits par ordonnance





19 % de douleurs aiguës

62 % de douleurs chroniques



La durée moyenne de traitement est plus de **deux fois plus longue chez les patients non traités pour un cancer (550 jours)** comparé aux patients traités pour un cancer (215 jours).



Fentanyl transmuqueux (n=11) **prescrit et dispensé hors AMM** : Hors cancer (n=3) et sans traitement de fond associé (n=3)



Médicaments associés

- 77 % des patients **sans** traitement laxatif associé
- 72 % des patients ont un **traitement antalgique associé**

62 % antalgiques non opioïdes (hors AINS)

10 % AINS

4,7 % étaient des opioïdes de palier 2, soit une faible proportion mais prescrite hors recommandations.

17 % anticonvulsivants

→ Près du quart de ces patients sont exposés à ces antalgiques associés depuis plus de 3 ans.



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS



Augmentation continue de la **population traitée** par antalgiques opioïdes (3,8 ordonnances par pharmacie et par semaine, soit la valeur la plus élevée enregistrée depuis 2007, malgré un taux de participation stable)



Féminisation progressive de la population traitée depuis la création de l'enquête (+ 10,4 % depuis 2001)



Progression des **non-conformités** relatives aux ordonnances (ex. + 4,9 % d'écart concernant l'espace entre la dernière ligne et la signature comparé à 2023)



QUELS LEVIERS SUR MA PRATIQUE A L'OFFICINE ?

- Identifier les patients à risque de trouble de l'usage, avec une attention particulière chez les patients non traités pour un cancer
- Sensibiliser sur les dangers liés à la **conduite de véhicule** en cas d'exposition aux antalgiques opioïdes
- Questionner systématiquement sur la **constipation** si aucun laxatif n'est prescrit
- Éviter l'association **codéine/tramadol** avec un **opioïde de palier 3** : aucun intérêt thérapeutique, risque accru d'effets indésirables



QUELLES PERSPECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE



Evaluer et promouvoir le bon usage des antalgiques en particulier dans les douleurs rhumatismales



Structurer le parcours de soin des patients ayant un troubles de l'usage liés aux antalgiques opioïdes en ville



Sensibilisation des patients jeunes traités par opioïdes aux risques d'accidents du travail et de la voie publique

