



**FICHE D'INFORMATION
AUX PERSONNES VACCINÉ(E)S**

IXCHIQ : vaccin contre le chikungunya

Le vaccin IxchIQ est un vaccin vivant atténué. Cela signifie qu'il contient une version très affaiblie du virus, modifiée pour ne pas provoquer la maladie tout en permettant à l'organisme de se défendre. Cette stimulation du système immunitaire aide ainsi à protéger la personne vaccinée contre le chikungunya.

IMPORTANT :

Vous devez continuer à vous **protéger contre les piqûres de moustique** même après la vaccination avec IxchIQ.

Ne donnez pas votre sang pendant au moins 4 semaines après la vaccination avec IxchIQ.

Comme tous les médicaments, le vaccin IxchIQ peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez toutes les personnes vaccinées. Dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas graves, même s'ils peuvent être gênants. Ils disparaissent dans la plupart des cas spontanément en quelques jours. Ils sont connus et attendus et, pour certains, ressemblent à une infection due au chikungunya.

Certains effets indésirables peuvent être graves, c'est-à-dire qu'ils nécessitent une prise en charge médicale.

Appelez-immédiatement ou faites appeler le 15 si vous présentez une réaction allergique grave.

Celle-ci se manifeste par plusieurs des symptômes suivants :

- Difficultés à respirer, respiration rauque ou sifflante
- Sensation de défaillance ou d'étourdissement
- Modifications du rythme cardiaque
- Gonflement des lèvres, du visage ou de la gorge

- Boutons ou plaques rouges sur la peau, parfois avec des démangeaisons (urticaire ou éruption cutanée)
- Fatigue

Autres effets indésirables potentiels

- Effets indésirables très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10) :
 - Maux de tête, nausées, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, fièvre ;
 - Au point d'injection : sensibilité au toucher, douleur, rougeur, durcissement ou gonflement ;
 - Sur la prise de sang : diminution du taux de globules blancs et /ou augmentation des taux d'enzymes du foie ;
- Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :
 - Gonflement des ganglions lymphatiques (dans le cou, sous les aisselles), étourdissements, douleurs oculaires, éruption cutanée (boutons ou plaques rouges sur la peau), frissons, douleurs au dos, diarrhées, vomissements ;
- D'autres effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) ou rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) peuvent également survenir. Nous vous invitons à consulter la notice du vaccin pour en savoir plus.

Des effets indésirables rares et graves ont été signalés en particulier chez des personnes âgées (65 ans ou plus) souffrant de plusieurs maladies chroniques. Ces effets indésirables comprenaient une détérioration de l'état de santé général ou une aggravation des affections chroniques et une inflammation du cerveau.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets indésirables, en particulier s'ils sont intenses ou inattendus, contactez immédiatement un médecin ou signalez-le à un pharmacien.

De même, informez immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère si vous constatez une détérioration de votre état de santé général ou une aggravation de vos maladies existantes.

Ces effets indésirables doivent être déclarés à votre centre régional de pharmacovigilance signalement.social-sante.gouv.fr



Pour en savoir plus sur le vaccin Ixchiq contre le chikungunya, lisez la notice et les informations complètes sur [la base de données publique des médicaments](#).

