

FICHE D'INFORMATION POUR
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



VIMKUNYA : vaccin contre le chikungunya

Le vaccin contre le chikungunya Vimkunya est un **vaccin recombinant adsorbé**. Il est indiqué dans l'immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

L'utilisation de ce vaccin doit être conforme aux recommandations officielles (consultez le site de la Haute Autorité de santé).

Contre-indication à l'utilisation de ce vaccin

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients

Surveillance post-vaccination : 15 minutes

ATTENTION : risque de syncope et de réaction anaphylactique

Les personnes recevant le vaccin doivent **être surveillées attentivement par un professionnel de santé pendant 15 minutes après l'injection du vaccin** en raison d'un risque de malaise et de syncope parfois sans symptômes présyncopaux et de très rares cas de réactions anaphylactiques.

Par conséquent :

- Interrogez la personne sur une potentielle inquiétude ou anxiété sur cette vaccination et apportez-lui les éléments pour la rassurer si nécessaire ;
- Soulignez l'importance de consulter rapidement un professionnel de santé si la personne ne se sent pas bien après la vaccination.

Afin de prévenir les blessures en cas de chute, la personne doit rester allongé (sur des tapis de sol ou couverture si ces derniers sont disponibles) ou assis par terre adossé à un mur dans un espace dégagé.

Une réaction anaphylactique est exceptionnelle et peut survenir comme avec tous les vaccins injectables. Vous devez toujours disposer d'un traitement médical approprié et appeler le 15 en cas de survenue d'une telle réaction.

Administration concomitante avec d'autres vaccins

L'administration concomitante de Vimkunya avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée.

Effets indésirables

- **Informez les personnes vaccinées des effets indésirables** potentiels, notamment des **effets indésirables très fréquents** (pouvant affecter plus d'1 personne sur 10) **ou fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) qui peuvent survenir :
 - Céphalées, myalgie, arthralgie, nausées, fatigue, frissons, malaise ;
 - Douleur au site d'injection.
- Pour les autres effets indésirables moins fréquents, consultez le résumé des caractéristiques du produit.

Certains effets indésirables, en particulier graves et/ou inattendus, non mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ou la notice, peuvent également survenir. Demandez aux patients de consulter dans ce cas un professionnel de santé.

Vous devez déclarer rapidement ces effets indésirables notamment s'ils sont particulièrement intenses ou inhabituels sur le portail de signalement : signalement.social-sante.gouv.fr



Utilisation chez les femmes enceintes ou qui allaitent

Grossesse :

Les données sur l'utilisation de Vimkunya chez les femmes enceintes sont limitées et ne permettent pas de conclure à l'absence d'effets potentiels sur la grossesse, le développement embryonnaire/fœtal, l'accouchement ou le développement post-natal.

La décision d'administrer Vimkunya pendant la grossesse doit tenir compte du risque individuel d'exposition au CHIKV de type sauvage, de l'âge gestationnel et du risque de transmission verticale du CHIKV de type sauvage au fœtus ou au nouveau-né.

Allaitement :

On ne sait pas si Vimkunya est excrété dans le lait maternel. Un risque pour l'enfant allaité ne peut être exclu. Les bénéfices de l'allaitement pour le développement et la santé de l'enfant devront être pris en compte au regard de la nécessité clinique d'utiliser Vimkunya chez la mère et des effets indésirables éventuels de Vimkunya chez l'enfant allaité.

Consultez les informations complètes sur le vaccin Vimkunya sur [la base de données publique des médicaments](#).

