



Rueil-Malmaison, 8 juillet 2026

Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
CS 80122
92568 Rueil-Malmaison cedex
France

T +33 1 39 17 80 00
F +33 1 47 49 55 15

Lettre destinée aux médecins prescripteurs (infectiologues, gastro-entérologues, hépatologues, chirurgiens viscéraux, pédiatres, internistes, généralistes) et aux pharmaciens hospitaliers

**Objet : Tensions d'approvisionnement des spécialités à base d'albendazole (ESKAZOLE et ZENTEL)
Rappel sur le bon usage et le circuit de distribution de ces spécialités**

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

En raison de tensions d'approvisionnement en albendazole en France, et en accord avec l'ANSM, le Laboratoire GSK souhaite vous apporter des éléments d'information et de rappel concernant le bon usage des spécialités ainsi que leur circuit de distribution :

ESKAZOLE 400 mg , flacon de 60 comprimés,	Code CIP : 3400936867420 - UCD 3400892785820
ZENTEL 400 mg , boîte de 1 comprimé,	Code CIP : 3400936848269 - UCD 3400892804552
ZENTEL 0,4g/10ml, suspension buvable , flacon 10 ml	Code CIP : 3400932970414 - UCD 3400891272222

Les spécialités à base d'albendazole commercialisées par GSK présentent des indications distinctes et des circuits de distribution différenciés, en correspondance avec les indications et les posologies recommandées :

ESKAZOLE 400 mg comprimés (boîte de 60 comprimés)

- Médicament **réservé à l'usage hospitalier**, disponible pour le patient via **rétrocession hospitalière**
- Ce médicament est indiqué dans le traitement de parasitoses :
 - échinococcose à *Echinococcus granulosus* (hydatidose)
 - échinococcose à *Echinococcus multilocularis* (échinococcose alvéolaire)

Le conditionnement de la spécialité Eskazole, en boîte de 60 comprimés est adapté aux posologies recommandées dans ses indications, à savoir 1 à 2 comprimés par jour pendant plusieurs mois.

Ainsi, il est important de demander au patient de se fournir, exclusivement, auprès de la pharmacie hospitalière la plus proche de son domicile afin de réserver le traitement Eskazole aux populations nécessitant ces conditionnements en boîte de 60 comprimés.

Le circuit hospitalier sera approvisionné de façon continue et des solutions d'importations sont en cours de mise en œuvre.

Pendant la durée de la tension d'approvisionnement la spécialité Eskazole et la spécialité importée en remplacement seront disponibles, pour les patients, uniquement via la rétrocession.

ZENTEL 400 mg comprimé (boîte de 1 comprimé)**ZENTEL 0,4 g/10 mL, suspension buvable (flacon de 10 mL)**

- Médicament **disponible uniquement dans les pharmacies de ville**
- Ces médicaments sont indiqués dans le traitement de parasitoses intestinales ou systémiques :
 - oxyurose (*Enterobius vermicularis*),
 - ascariodose (*Ascaris lumbricoïdes*),
 - ankylostomose (*Ankylostoma duodenale*, *Necator americanus*),
 - trichocéphalose (*Trichuris trichiura*),
 - anguillulose (*Strongyloïdes stercoralis*),
 - taeniasis (*Taenia saginata*, *Taenia solium*),
 - giardiose (*Giardia intestinalis* ou *duodenalis*) de l'enfant.
 - trichinellose (*Trichinella spiralis*).

Les conditionnements de la spécialité Zentel, en boîte de 1 comprimé ou en flacon de 10 ml, sont adaptés aux posologies recommandées dans ses indications, à savoir 1 comprimé par jour (généralement en prise unique).

Voir ci-dessous le tableau des posologies et des durées de traitement :

ZENTEL 400 mg comprimé* ou ZENTEL 0,4 g/10 mL suspension buvable**			
Posologies et Durée de Traitement			
Indication		Dose quotidienne	Durée du traitement
Infections intestinales et cutanées	Oxyurose	Enfant 1–2 ans*: 200 mg Adulte / enfant > 2 ans : 400 mg = 1 comprimé	Prise unique à répéter à J7
	Ascariodose Ankylostomose Trichocéphalose	Enfant 1–2 ans*: 200 mg Adulte / enfant > 2 ans : 400 mg = 1 comprimé	Prise unique***
	Anguillulose Taeniasis (associé à d'autres parasitoses)	Adulte / enfant > 2 ans : 400 mg = 1 comprimé	1 prise/jour pendant 3 jours***
	Giardiose	Enfant > 2 ans : 400 mg = 1 comprimé	1 prise/jour pendant 5 jours
	Infection systémique	Trichinellose Enfant : 15 mg/kg/jour en 2 prises (max 800 mg/j) Adulte : 800 mg/j = 1 comprimé matin + 1 comprimé soir	10 à 15 jours en fonction de la sévérité de la maladie
* Les comprimés peuvent être mâchés ou écrasés et avalés avec un peu d'eau. ** la forme comprimée dosée à 400 mg n'est pas adaptée aux enfants de 1 à 2 ans : privilégier la suspension buvable. *** En cas d'anguillulose, de trichocéphalose ou de taeniasis, une seconde cure peut être nécessaire si l'examen parasitologique des selles à 3 semaines est positif.			

La remise à disposition normale de ces spécialités est, pour le moment, indéterminée mais des solutions d'importations sont actuellement en cours.

Dans le contexte de tensions actuelles et afin de garantir l'accès au traitement pour les patients nécessitant ces spécialités Eskazole et Zentel, nous vous recommandons de :

- **réserver l'utilisation du Zentel aux situations dans lesquelles aucune alternative thérapeutique appropriée n'est disponible**, en fonction de l'indication et des recommandations en vigueur ;
- **réserver l'utilisation de la suspension buvable aux enfants nécessitant des posologies inférieures à 400 mg et aux patients rencontrant des difficultés de déglutition** (pour rappel les comprimés peuvent être mâchés ou écrasés et avalés avec un peu d'eau) ;
- **respecter les circuits de distribution en évitant les reports inappropriés entre les circuits ville et hôpital (Zentel pour les traitements de courte durée, en ville, et Eskazole pour les traitements longue durée, en rétrocession hospitalière).**
Il convient notamment de ne pas recourir à des prescriptions multiples de Zentel visant à reproduire les posologies relevant du conditionnement d'Eskazole (boîte de 60 comprimés). Les prescriptions correspondant aux indications de l'Eskazole (Echinococcose) doivent être orientées vers le circuit hospitalier.

Ces recommandations visent à :

- garantir la continuité des traitements pour les patients les plus à risque,
- optimiser l'utilisation des ressources disponibles,
- limiter l'impact des tensions d'approvisionnement sur la prise en charge des patients.

Pour plus d'information sur ces spécialités **ESKAZOLE 400 mg comprimés**, **ZENTEL 400 mg comprimés** et **ZENTEL 0,4g/10mL suspension buvable**, consultez www.ansm-sante.fr ou www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

Notre Département d'Information et d'Accueil Médical (e-mail : diam@gsk.com, tél : 01 39 17 84 44 – fax : 01 39 17 84 45) ainsi que notre Service Clients (Tél : 02 32 28 57 00) restent à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire et vous accompagner dans la prise en charge des situations spécifiques.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des difficultés occasionnées et vous remercions par avance pour votre compréhension. Comptant sur votre collaboration dans ce contexte particulier, nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, nos salutations les meilleures.

Ouided MSALLEM
Pharmacien Responsable

Dr Mouna CHAMPAIN
Directrice Médicale