

PA241282



Patientenausweis

Eliquis®
(Apixaban)

Sie/das Kind/die Betreuungsperson sollte(n)
diesen Ausweis ständig bei sich tragen
Zeigen Sie diesen Ausweis dem Apotheker, dem Zahnarzt
und allen Ärzten, bevor eine Behandlung erfolgt.

Information für Patienten/Betreuungspersonen

- Nehmen/Verabreichen Sie Eliquis regelmäßig nach den Anweisungen Ihres Arztes (ein). Wenn Sie eine morgendliche Einnahme vergessen haben, nehmen/verabreichen Sie die Tablette, sobald Sie es bemerken; die Einnahme/Verabreichung kann zusammen mit der Abenddosis erfolgen. Eine vergessene Abenddosis darf nur am selben Abend eingenommen/verabreicht werden. Nehmen/Verabreichen Sie am nächsten Morgen nicht zwei Dosen (ein); setzen Sie stattdessen die Einnahme/Verabreichung wie gewohnt zweimal täglich wie empfohlen am nächsten Tag fort.
- Brechen Sie die Behandlung mit Eliquis nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt ab, da bei Ihnen/dem Patienten das Risiko eines Schlaganfalls/Blutgerinnsels oder anderer Komplikationen besteht.

- Eliquis hilft, das Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.
- Anzeichen und Symptome von Blutungen können Blutergüsse oder Einblutungen unter der Haut, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, Schwäche, plötzliche starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.
- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls bei Ihnen eine Blutung nicht selbstständig aufhört.
- Falls bei Ihnen/dem Patienten eine Operation oder ein invasiver Eingriff notwendig sein sollte, informieren Sie vor der Operation den behandelnden Arzt, dass Sie/der Patient Eliquis einnehmen/einnimmt.

Juli 2025



Patiëntenkaart

Eliquis®
(apixaban)

Het is belangrijk dat u/het kind/de
verzorger deze kaart altijd bij u/zich draagt
Laat deze kaart zien aan de apotheker, de tandarts en alle
andere medische zorgverleners vóór de behandeling.

Informatie voor patiënten/verzoekers

- Gebruik/geef Eliquis altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis in de ochtend heeft gemist, neem/geef deze dan zodra u eraan denkt. Deze dosis kan tegelijk met de avonddosis worden ingenomen/gegeven. Een gemiste avonddosis mag alleen nog dezelfde avond worden ingenomen/gegeven. Neem/geef niet de volgende ochtend twee doses, maar houdt u daarna weer aan het gebruikelijke dosierschema van tweemaal daags zoals aanbevolen.
- Stop niet met het innemen/geven van Eliquis zonder overleg met de arts, omdat u/de patiënt risico loopt op een beroerte of andere problemen als gevolg van het ontstaan van een beroerte/bloedstolsel.

- Eliquis helpt het bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het risico op bloedingen.
- Klachten en verschijnselen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus, duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of braken van bloed.
- Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Als u/de patiënt een operatie of een invasieve procedure moet ondergaan, vertel de behandelend arts dan dat u/de patiënt Eliquis gebruikt.

Juli 2025



Carte patient

Eliquis®
(apixaban)

Cette carte doit être conservée avec
vous/l'enfant/l'aidant en permanence.
Présentez cette carte au pharmacien, au dentiste et à
tout autre professionnel de santé avant tout traitement.

Information destinée aux patients/aidants

- Prenez/donnez Eliquis à heures fixes, comme indiqué. Si vous oubliez une dose le matin, prenez/donnez-la dès que vous vous en apercevez et elle peut être prise/donnée en même temps que la dose du soir. Une dose oubliée le soir ne peut être prise/donnée qu'au cours de la même soirée. Ne prenez/donnez pas deux doses le lendemain matin, mais au contraire continuez de suivre le lendemain le schéma posologique habituel à deux fois par jour conformément à la prescription.
- N'arrêtez pas de prendre/ donner Eliquis sans en avoir parlé au médecin car vous (ou le patient) vous exposez à un risque d'accident vasculaire cérébral, de formation d'un caillot sanguin ou d'autres complications.

- Eliquis aide à fluidifier le sang. Cependant, cela peut augmenter le risque de saignement.
- Les signes et les symptômes de saignement incluent des ecchymoses ou des saignements sous la peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, des sensations vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou faiblesse, maux de tête intenses et soudains, crachats de sang ou vomissement de sang.
- Si le saignement ne s'arrête pas de lui-même, demandez immédiatement un avis médical.
- En cas de chirurgie ou d'une quelconque procédure invasive, informez le médecin que vous prenez/que le patient prend Eliquis.

Juillet 2025

**Ich werde mit dem Antikoagulans
Eliquis (Apixaban) behandelt, um der
Entstehung von Blutgerinnseln
vorzubeugen.**

Information für Arzt und Apotheke

- Eliquis (Apixaban) ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.
- Eliquis kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Eliquis unverzüglich abzubrechen.
- Die Behandlung mit Eliquis erfordert keine Routinüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer anti-Faktor Xa Test kann in Ausnahmesituationen, z.B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein (Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)). Gerinnungstests sind nicht empfohlen - siehe Fachinformation.
- Ein Arzneimittel zur Aufhebung der Anti-FXa-Aktivität von Apixaban steht zur Verfügung; seine Sicherheit und Wirksamkeit wurde jedoch bei pädiatrischen Patienten nicht erwiesen (Siehe Fachinformation zu Andexanet alfa).

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie den Arzt darum

Name: _____
Geburtsdatum: _____
Indikation: _____
Gewicht: _____
Dosierung: _____ mg 2 x täglich
Name des Arztes: _____
Telefonnummer des Arztes: _____

**Ik ben onder behandeling voor
antistolling middels Eliquis (apixaban)
ter preventie van bloedstolsels**

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

- Eliquis (apixaban) is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor-Xa.
- Eliquis kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met Eliquis direct gestaakt worden.
- Bij de behandeling met Eliquis is routinematig monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een geïndiceerde kwantitatieve anti-factor Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosering en noodchirurgie (prothrombinetijd (PT) internationale genormaliseerde ratio (INR) en een en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (PTT) stollingsstijd worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.
- Voor volwassenen is er een middel beschikbaar om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren. De veiligheid en werkzaamheid hiervan zijn echter niet vastgesteld bij pediatrische patiënten (raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken van andexanet alfa).

Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag de arts dit te doen

Naam: _____
Geboortedatum: _____
Indicatie: _____
Gewicht: _____
Dosering: _____ mg tweemaal daags
Naam van de arts: _____
Telefoonnummer van de arts: _____

**Je suis sous traitement anticoagulant
avec Eliquis (apixaban) pour prévenir la
formation de caillots sanguins.**

Information destinée aux professionnels de santé

- Eliquis (apixaban) est un anticoagulant oral agissant par inhibition directe et sélective du facteur Xa.
- Eliquis peut augmenter le risque de saignement. En cas d'événements hémorragiques majeurs, il doit être arrêté immédiatement.
- Le traitement par Eliquis ne nécessite pas de surveillance de routine de l'exposition. Un test quantitatif étagé anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d'intervention chirurgicale d'urgence (les résultats des paramètres de la coagulation, temps de prothrombine (TP), rapport normalisé international (INR) et temps de céphaline activé (TCA) ne sont pas recommandés) - voir le RCP.
- Un agent permettant d'inverser l'activité anti-Facteur Xa d'apixaban est disponible chez les adultes. Toutefois, sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques (consulter le résumé des caractéristiques du produit de l'andexanet alfa).

Veuillez compléter cette rubrique ou demander au
médecin de le faire

Nom : _____
Date de naissance : _____
Indication : _____
Poids : _____
Dose : _____ mg deux fois par jour
Nom du médecin : _____
N° de téléphone du médecin : _____