

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé :
<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM :
<http://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Afin de faciliter un suivi et une traçabilité efficaces de toutes les biothérapies, notamment des biosimilaires, il est recommandé que le nom de marque et le numéro de lot soient mentionnés lors de la déclaration d'événements indésirables.

Autres informations (veuillez compléter) :

Nom du patient :

Nom du médecin :

Numéro de téléphone du médecin :

Carte Patient

Nepexto® étanercept

Ce document est diffusé sous l'autorité de l'ANSM.

Veuillez conserver cette carte sur vous en permanence.

Cette carte contient des informations de sécurité importantes que vous devez connaître avant de recevoir Nepexto et pendant le traitement avec Nepexto. Si vous ne comprenez pas ces informations, veuillez demander à votre médecin de vous les expliquer.

Montrez cette carte à tout médecin impliqué dans votre traitement. Conservez cette carte 2 mois après la dernière dose de Nepexto, car des effets indésirables peuvent survenir après votre dernière dose de Nepexto.

Pour plus d'informations, consultez la notice de Nepexto.
Ce médicament est un biosimilaire.

Biocon Biologics France SAS. 26 rue Général Mouton Duvernet 69003 Lyon.
RCS PARIS 951 328 244.

Infections

Nepexto peut augmenter votre risque de contracter des infections, qui pourraient être graves.

Vous ne devez pas utiliser Nepexto

- Si vous souffrez d'une infection. En cas de doute, demandez à votre médecin.
- Si vous présentez des symptômes évocateurs d'une infection, tels que fièvre, toux persistante, essoufflement, frissons, faiblesse, perte de poids ou grande fatigue, consultez immédiatement votre médecin.

Nepexto ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents pesant moins de 62,5 kg.

Vous devez effectuer un test de dépistage de la tuberculose.

Demandez à votre médecin de noter ci-dessous la date et le résultat de votre dernier dépistage de la tuberculose :

Test :

Date :

Résultats :

Test :

Date :

Résultats :

Veillez demander à votre médecin de lister les autres médicaments qui peuvent augmenter votre risque d'infection :

.....

.....

Insuffisance cardiaque congestive

Si vous commencez à ressentir de la fatigue, un essoufflement ou un gonflement des chevilles, qui peuvent suggérer une insuffisance cardiaque congestive (ICC), ou si l'un des symptômes ci-dessus s'aggravent, ou si vous ressentez ces symptômes pour la première fois, consultez immédiatement un médecin.