



Lettre d'information à l'attention des pharmaciens hospitaliers, des prescripteurs spécialistes hospitaliers et des prescripteurs spécialistes en cabinet

Monaco le 3/08/2026

Objet : Rupture de stock – **NEOSYNEPHRINE 2,5% FAURE, collyre en solution en récipient unidose (boîte de 20 unidoses)**

Mise à disposition de la spécialité **Minims Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v Eye Drops, Solution (boîte de 20 unidoses** - groupe Bausch & Lomb) initialement destinée au Royaume-Uni

Cher(e) Confrère, Chère Consœur, Cher Docteur,

Nous vous informons que nous sommes actuellement en rupture de stock de notre spécialité **NEOSYNEPHRINE 2,5% FAURE, collyre en solution en récipient unidose, boîte de 20 unidoses de 0,4 ml.**

En accord avec l'ANSM et afin d'assurer la continuité d'approvisionnement du marché français, nous vous informons de la mise à disposition (MAD), à titre exceptionnel et transitoire, de la spécialité équivalente suivante, initialement destinée au Royaume-Uni : **Minims Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v Eye Drops, Solution (boîte de 20 unidoses** - groupe Bausch & Lomb).

Cette spécialité est équivalente en concentration de substance active, mais de composition en excipients différente (voir tableau ci-dessous) et de volume différent (unidoses de 0,5mL au lieu de 0,4mL).

Ces unités mises à disposition sont destinées aux **professionnels de santé à l'hôpital et aux ophtalmologistes pour leur commandes en Unités Professionnelles au cabinet.** Leur étiquetage est en langue anglaise et ne présente ni le pictogramme grossesse, ni le pictogramme conduite.

Chaque commande délivrée de **Minims Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v Eye Drops, Solution (boîte de 20 unidoses de 0,5 ml)** est accompagnée de cette lettre à destination des professionnels de santé.

Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) français de **NEOSYNEPHRINE 2,5% FAURE, collyre en solution en récipient unidose** est disponible en flashant le QR code suivant :





Nous vous rappelons qu'en raison de ses puissantes propriétés vasoconstrictives, l'utilisation de phényléphrine par voie oculaire ne doit être envisagée **que si nécessaire au cours de la grossesse**. Par ailleurs, la spécialité est **contre-indiquée pendant le premier trimestre** de grossesse.

Le collyre de chlorhydrate de phényléphrine provoquant notamment une mydriase et une photophobie, la prise de ce médicament rend la **conduite de véhicules et/ou l'utilisation de machines** dangereuse. La reprise de la conduite par le patient nécessite un avis médical.

Nous attirons votre attention sur des **différences** entre la spécialité NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE, collyre en solution en récipient unidose et la spécialité mise à disposition **Minims Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v Eye Drops, Solution** :

Caractéristique	NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE, collyre en solution en récipient unidose En rupture	Minims Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v Eye Drops, solution MAD
Concentration	2,5%	2.5% w/v
Volume unidose	0,4 ml	0.5 ml
Indications	Ce collyre est indiqué pour obtenir une mydriase à visée diagnostique, thérapeutique, ou pré-opératoire	La spécialité MAD doit être utilisée uniquement dans les indications de la spécialité française
Posologie	ADULTE Une instillation dans l'œil à renouveler si nécessaire après 15 minutes (voire 20 minutes), sans dépasser trois instillations. Chez les sujets âgés, une prudence particulière est nécessaire. Population pédiatrique Prématuré, nouveau-né (0 à 27 jours) et nourrisson (28 jours à 2 ans) Une instillation limitée à 1 seule goutte dans l'œil sans renouvellement.	La spécialité MAD doit être utilisée à la même posologie que la spécialité française NEOSYNEPHRINE 2,5 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose

	Chez les prématurés de poids $\leq$ 1500 g, les données disponibles sont limitées. Chez les enfants (2 ans à 12 ans) Une instillation dans l'œil. Il n'est généralement pas nécessaire de renouveler l'application. Chez les adolescents (12 à 18 ans) Si nécessaire, l'instillation sera renouvelée après 15 minutes (voire 20 minutes). La dose maximale ne doit pas dépasser deux instillations	
Excipients	Acide borique, borax, édétate disodique, eau pour préparations injectables	Edétate sodique Métabisulfite sodique* Eau purifiée <i>*excipient à effet notoire : Peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et des bronchospasmes.</i>

Concernant les contre-indications et les précautions d'emploi de la spécialité **MAD** merci de vous référer aux rubriques 4.3 et 4.4 du RCP français de NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE, collyre en solution en récipient unidose.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR VOS COMMANDES

Les codes CIP et UCD France ne sont pas présents sur les boîtes.

Vos commandes doivent être adressées comme habituellement à notre dépositaire MOVIANO sous le code habituel de la spécialité **NEOSYNEPHRINE 2,5% FAURE, collyre en solution en récipient unidose (boîte de 20 unidoses)**. En effet notre dépositaire a mis en place un « remplacer par » informatique afin de vous livrer les quantités commandées en Minims Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v Eye Drops, Solution (boîte de 20 unidoses de 0,5 ml).

Pour toutes questions relatives à une commande, vous pouvez contacter le service client par email à l'adresse suivante : outofstock.france@theapharma.com.



Nous vous informons que les laboratoires EUROPHTA assurent la responsabilité des lots mis à disposition notamment en matière d'information médicale, de pharmacovigilance et des réclamations qualité.

Information médicale

Pour toute demande d'information médicale, déclaration de pharmacovigilance, de réclamation qualité, ou tout complément d'information nous vous invitons à contacter le 01 41 12 21 75.

Déclaration des effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté ou erreur médicamenteuse suspectée d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

Nous sommes conscients des désagréments occasionnés. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir un approvisionnement normal.

Nous vous tiendrons informés dès que nous serons de nouveau en mesure de vous approvisionner en **NEOSYNEPHRINE 2,5% FAURE, collyre en solution en récipient unidose boîte de 20 unidoses de 0,4 ml**

Veuillez agréer, Cher(e) Confrère, Chère Consœur, Cher Docteur, nos salutations distinguées.

Isabelle Capelier
Pharmacien Responsable

LETMINNEO2