



Rueil-Malmaison, Août 2026

Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
CS 80122
92568 Rueil-Malmaison cedex
France

T +33 1 39 17 80 00
F +33 1 47 49 55 15

Note d'information destinée au patient

**Mise à disposition d'ALBENDAZOLE 400 mg comprimé (flacon de 200)
en remplacement de ESKAZOLE 400 mg comprimés (flacon de 60)**

Madame, Monsieur,

Dans le contexte de difficultés d'approvisionnement actuellement rencontrées pour la spécialité pharmaceutique ESKAZOLE 400 mg comprimés (en flacon de 60 comprimés), le pharmacien hospitalier vous a dispensé une boîte d'**Albendazole 400 mg, comprimé**, spécialité **initialement destinée au marché international** et importée par le Laboratoire GSK, en accord avec l'ANSM.

Cette spécialité importée présente le même principe actif, le même dosage (400 mg), et les mêmes indications que la spécialité ESKAZOLE 400 mg commercialisée sur le marché français.

Elle **diffère uniquement par son étiquetage en langue anglaise, par la couleur blanche du comprimé et par le nombre de comprimés présent dans le flacon : 200 comprimés au lieu de 60 comprimés pour le flacon d'ESKAZOLE.**

Nous attirons votre attention sur le point suivant : la quantité de 200 comprimés qui vous est délivrée correspond à un traitement d'une durée de 3 mois pour une posologie d'un comprimé 2 fois par jour.

Ce flacon vous est délivré dans un sachet plastique contenant une notice en français.

Les contre-indications à respecter :

- hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des excipients ;
- grossesse et femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception efficace ;
- allaitement.

Pour rappel, les pictogrammes suivants sont présents sur le conditionnement secondaire ESKAZOLE 400 mg comprimés :



Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucune étude n'a été menée pour évaluer l'effet de l'albendazole sur l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines, il devra être pris en compte que des sensations vertigineuses peuvent apparaître après l'utilisation de l'albendazole

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

Nous vous précisons que le Laboratoire GSK prend en charge la responsabilité de l'exploitation de ces boîtes en ce qui concerne notamment l'information, la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles.

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Notre Département d'Information et d'Accueil Médical (01 39 17 84 44 ou diam@gsk.com) reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.

Conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions par avance pour votre compréhension et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations.

Ouïded MSALLEM
Pharmacien Responsable

Dr Mouna CHAMPAIN
Directeur Médical