

PRÉVENTION DES INFECTIONS À VRS

Le bon produit pour le bon patient



Ne confondez pas anticorps monoclonal et vaccin

Anticorps monoclonal pour :
nourrisson / nouveau-né / enfant ≤ 24 mois

Vaccin pour :
femme enceinte / adulte

Ne cumulez pas les deux sauf exception

Avant toute injection, vérifiez : 1. Le patient | 2. Le médicament | 3. La dose | 4. La voie d'administration

Ces traitements doivent être utilisés conformément aux recommandations officielles du ministère chargé de la santé figurant dans le calendrier vaccinal en vigueur



Nouveau-né et nourrisson

Première saison d'exposition au VRS

Anticorps monoclonal

Beyfortus (nirsévimab)

Moins de 5 kg : 1 seule injection de 50 mg

5 kg ou plus : 1 seule injection de 100 mg

- En intramusculaire
- Dans la face antérolatérale de la **cuisse**
- **Dès la naissance** pour les enfants nés pendant la campagne VRS ou **dès le début de la campagne** pour les autres



Ne pas administrer dans le muscle fessier

Enflonsia (clesrovimab)

1 seule injection de 105 mg

- En intramusculaire
- Dans la face antérolatérale de la **cuisse**
- **Dès la naissance** pour les enfants nés pendant la campagne VRS ou **dès le début de la campagne** pour les autres



Ne pas administrer dans le muscle fessier



Femme enceinte

Pour la protection passive du nourrisson

Vaccin

Abrysvo

1 seule injection de 0,5 mL

- En intramusculaire
- Dans le **deltoïde**
- **Entre 32 et 36 semaines** d'aménorrhée, pendant la campagne d'immunisation VRS
- Si la naissance survient moins de 14 jours après vaccination ou si prématurité = rattrapage par anticorps monoclonal recommandé chez le nouveau-né



Chez les femmes enceintes immunodéprimées ou déjà vaccinées contre le VRS lors d'une grossesse précédente => privilégier l'immunisation du bébé avec un anticorps monoclonal



Enfant ≤ 24 mois

Vulnérable à une infection sévère
Deuxième saison d'exposition au VRS

Anticorps monoclonal

Beyfortus (nirsévimab)

2 injections de 100 mg le même jour, chacune sur un site différent

- En intramusculaire
- Dans la face antérolatérale de la **cuisse**
- Au cours de la campagne VRS **lors de la 2e saison VRS**



Ne pas administrer dans le muscle fessier



Adulte

≥ 75 ans
ou

≥ 65 ans avec pathologie respiratoire chronique ou cardiaque susceptible de décompenser

Vaccin

Abrysvo ou Arexvy ou mResvia

1 seule injection de 0,5 mL

- En intramusculaire
- Dans le **deltoïde**
- **Vaccination saisonnière.** La nécessité d'une revaccination avec une dose supplémentaire n'a pas été établie