Information de sécurité

Spécialités en AAC à base de Propranolol : risque d'erreur médicamenteuse due aux différences entre les dispositifs d'administration

- Les spécialités **Propranolol Rosemont, solution buvable** et **Propranolol SF solution buvable** sont toutes les deux disponibles en AAC. Ces spécialités sont des alternatives de la spécialité Hémangiol.
- Nous attirons toutefois votre attention sur les différences existantes entre elles et avec la spécialité Hémangiol, à base de propranolol, en termes de concentrations en propranolol, de présence d'un dispositif d'administration et de la graduation de ce dernier (mg ou mL).

Spécialité	Propranolol SF	Propranolol Rosemont	Hemangiol
Concentration	5 mg/mL 10 mg/mL 50 mg/mL	5 mg/mL 10 mg/mL 50 mg/mL	3,75 mg/mL
Présence d'un dispositif	Oui	Non (à dispenser en plus)	Oui
Graduation du dispositif	En mL	/	En mg

- Propranolol Rosemont ne possède pas son propre dispositif d'administration (contrairement à propranolol SF). Un dispositif adapté à la dose et au volume prescrits doit donc être fourni au moment de la dispensation de Propranolol Rosemont.

- Les patients doivent strictement utiliser le dispositif d'administration présent dans le conditionnement de la spécialité dispensée, ou celui fourni lors de la dispensation lorsque la spécialité ne contient pas de dispositif dans son conditionnement. Ils ne doivent pas se servir d'un dispositif appartenant à une autre spécialité.

- Une attention particulière doit être portée en cas de remplacement d'une spécialité à base de propranolol par une autre. En effet, des erreurs ont été rapportées après un

tel changement, liées à une erreur de dispositif d'administration utilisé, ayant mené à une dose incorrecte de propranolol administrée.

- En raison des risques graves potentiellement associés à l'administration d'une dose incorrecte, nous vous rappelons que, quelle que soit la spécialité dispensée, le patient ou son soignant/sa famille doit être guidé par les professionnels de santé pour s'assurer de la bonne utilisation du dispositif d'administration, en notant de façon claire la graduation adéquate sur le dispositif, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre la dose en mg et le volume en mL.