



Rueil-Malmaison, Septembre 2026

Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
CS 80122
92568 Rueil-Malmaison cedex
France

T +33 1 39 17 80 00
F +33 1 47 49 55 15

Note d'information destinée au patient

**Mise à disposition « Albendazole Tablets, USP 200 mg »
(flacon de 2 comprimés)**

en remplacement de ZENTEL 400 mg comprimé (boîte de 1 comprimé)

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit ZENTEL 400 mg, comprimés.

Dans le contexte de difficultés d'approvisionnement actuellement rencontrées pour la spécialité pharmaceutique ZENTEL 400 mg, comprimés (en boîte de 1 comprimé), le pharmacien vous a dispensé une boîte de « **Albendazole Tablets, USP 200 mg** » **initialement destinée aux Etats-Unis, commercialisée par le Laboratoire Dr Reddy's**, et importée par le Laboratoire GSK, en accord avec l'ANSM.

Cette spécialité importée possède le même principe actif, l'abendazole, que la spécialité ZENTEL 400 mg commercialisée sur le marché français.

Cependant, nous attirons votre attention sur les différences entre les deux spécialités concernant le conditionnement et la quantité de principe actif (dosage) par comprimé (cf. tableau comparatif ci-après) :

	Spécialité en rupture de stock	Spécialité de remplacement
Nom entier	ZENTEL 400 mg, comprimé	Albendazole Tablets, USP 200 mg
Dosage	400 mg	200 mg
Présentation	Boîte de 1 comprimé	Flacon de 2 comprimés
Couleur du comprimé	Orange	Blanc
Etiquetage du conditionnement	Français	Anglais (étiquette flacon et notice)
Durée et température de conservation	5 ans à une température ne dépassant pas 30°C	3 ans à une température entre 20 et 25°C



Un flacon *Albendazole Tablets USP 200 mg* (2 comprimés) = une boîte *Zentel 400 mg* (1 comprimé)

Si votre médecin vous a prescrit du Zentel avec une posologie de 1 comprimé dosé à 400 mg, vous devez prendre les 2 comprimés d'Albendazole 200 mg, en une seule prise.

Ce flacon vous est délivré dans un sachet plastique contenant une notice en français. Ne pas tenir compte de la notice en anglais accrochée au flacon.

Les contre-indications à respecter :

- hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des excipients ;
- grossesse et femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception efficace ;
- allaitement.

Pour rappel, les pictogrammes suivants sont présents sur le conditionnement secondaire de ZENTEL 400 mg comprimé :



Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucune étude n'a été menée pour évaluer l'effet de l'albendazole sur l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines, il devra être pris en compte que des sensations vertigineuses peuvent apparaître après l'utilisation de l'albendazole

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr ou base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

Nous vous précisons que le Laboratoire GSK est en charge des aspects liés à l'information médicale, à la pharmacovigilance et au traitement des réclamations éventuelles concernant ces boîtes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Notre Département d'Information et d'Accueil Médical (01 39 17 84 44 ou diam@gsk.com) reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, nos salutations.

Ouided MSALLEM
Pharmacien Responsable

Dr Mouna CHAMPAIN
Directeur Médical