

Veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit YESCARTA®, notamment la Notice d'Information Patient et la Brochure à destination des professionnels de santé. Pour obtenir ces documents, contactez le département d'information médicale de Gilead.

Téléphone **0800 45 04 60** ou **01 46 09 41 00** - Email : FRMed.Info@gilead.com

Déclaration des effets indésirables : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr>. Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du Médicament.

En complément de la déclaration officielle sur le portail des autorités, vous pouvez aussi déclarer les effets indésirables directement au laboratoire à l'adresse suivante : Safety_FC@gilead.com

La Société Européenne de Greffe de moelle (EBMT) et le LYSARC (Lymphoma Academic Research Organisation) tiennent des registres pour le suivi des patients traités par YESCARTA®. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'EBMT ou le LYSARC par email : registryhelpdesk@ebmt.org ou contact@lysarc.org.

YESCARTA®, le logo YESCARTA®, Kite® et le logo Kite® sont des marques déposées de Kite Pharma, Inc. GILEAD est une marque déposée de Gilead Sciences, Inc.



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- Ce patient a reçu une immunothérapie constituée de cellules T autologues génétiquement modifiées, pouvant conduire à un syndrome de relargage cytokinique et à des effets indésirables neurologiques graves, voire fatals. Le syndrome de relargage cytokinique peut occasionner des défaillances d'organe.
- **MISES EN GARDE** : syndrome de relargage cytokinique et effets indésirables neurologiques. Pour plus d'informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (suite)

- Évaluez le patient à la recherche de signes ou symptômes de syndrome de relargage cytokinique et d'effets indésirables neurologiques.
- Consultez la Brochure à destination des professionnels de santé sur la façon de prendre en charge le syndrome de relargage cytokinique et les effets indésirables neurologiques.
- **Contactez immédiatement le médecin hématologue du patient pour plus d'informations.**



CARTE PATIENT

- ▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Pour plus d'informations sur YESCARTA®, vous pouvez aussi consulter le Résumé des Caractéristiques du produit et la Notice d'Information Patient sur le site de la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>.

Emportez cette carte avec vous si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous consultez un professionnel de santé autre que votre hématologue.

Assurez-vous d'informer tous les professionnels de santé que vous consultez que vous êtes traité(e) avec une immunothérapie constituée de cellules T autologues et MONTREZ-LEUR CETTE CARTE.

COORDONNÉES DE MON HÉMATOLOGUE ET DATE DE LA PERFUSION

Nom de l'hématologue :	Produit perfusé : YESCARTA®
Numéro de téléphone :	Numéro de lot du produit :
Numéro de téléphone en dehors des heures de consultation (numéro d'urgence) :	Date de la perfusion :
Mon nom et numéro de téléphone :	

RAPPELS IMPORTANTS POUR LES PATIENTS

- Si vous présentez de la fièvre, des nausées sévères, des vomissements, des diarrhées, de la fatigue ou si tout autre nouveau symptôme apparaît, en particulier l'un des symptômes mentionnés sur cette carte, prévenez immédiatement votre équipe soignante ou tout professionnel de santé disponible.
- Ne traitez aucun de ces symptômes avec des médicaments (incluant ceux disponibles sans ordonnance ou des compléments à base de plantes/alimentaires) sans l'autorisation préalable de votre professionnel de santé.

RAPPELS IMPORTANTS POUR LES PATIENTS (suite)

- YESCARTA® peut provoquer des effets indésirables graves dans différentes parties de votre corps. Ces symptômes peuvent mettre en jeu le pronostic vital, voire même être fatals, et doivent être immédiatement pris en charge.

Des symptômes qui paraissent légers peuvent rapidement s'aggraver.

Les symptômes peuvent être retardés et survenir plusieurs semaines après la perfusion.

Ne vous sentez pas gêné(e) et n'ayez pas l'impression de déranger votre professionnel de santé.

Appelez votre professionnel de santé dès que vous constatez l'un de ces symptômes

Effets indésirables neurologiques

- Confusion
- Difficulté d'élocution
- Difficulté de compréhension
- Tremblements (bras ou parties du corps qui tremblent)
- Agitation
- Somnolence accrue
- Sensation de vertiges

Syndrome de relargage cytokinique

- Fièvre (par ex. température supérieure à 38 °C)
- Fatigue extrême
- Difficulté à respirer
- Volume urinaire faible
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Battements de cœur irréguliers