Carte d'Alerte pour le Patient : CAPRELSA® (vandetanib)

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

ESTEVE

Pour plus d'information, veuillez lire attentivement la notice de CAPRELSA® contenue dans la boîte ou consulter la base de données publique des médicaments :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

Assurez-vous d'avoir avec vous la liste de tous les médicaments pris par vous ou votre enfant à chaque consultation chez votre médecin.

Nom du patient :

Nom du médecin :

N° de téléphone du médecin :

Date d'initiation du traitement par CAPRELSA® :

CAPR_FR_MARR 03_SEPT2026_V01

Informations pour le patient ou l'aidant

- Cette carte contient des informations de sécurité importantes que vous devez connaître avant de prendre CAPRELSA® et pendant le traitement par CAPRELSA®.
- Veuillez montrer cette carte à tout médecin intervenant dans votre traitement ou celui de votre enfant. Si vous ou votre enfant ressent(ez) un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé https://signalement.social-sante.gouv.fr.

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : https://ansm.sante.fr.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Pendant le traitement par CAPRELSA®, appelez immédiatement votre médecin si vous ou votre enfant présente(z) les symptômes suivants :

- Malaises, vertiges ou troubles du rythme cardiaque, car il peut s'agir de symptômes d'une modification de l'activité électrique de votre cœur, appelée allongement de l'intervalle QTc.
- Diarrhée sévère ou aggravation d'une diarrhée pré-existante, celle-ci pouvant entraîner des déséquilibres aggravant le risque d'allongement de l'intervalle QTc.
- Maux de tête, crises épileptiques, convulsions, confusions, troubles de la vision ou de la concentration, car il peut s'agir de symptômes d'un syndrome cérébral appelé syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible.

N'arrêtez pas ou ne modifiez pas votre traitement (ou le traitement de votre enfant) par CAPRELSA® sans l'avis de votre médecin.

Si vous (ou votre enfant) avez pris plus de CAPRELSA® que vous auriez dû, contactez immédiatement votre médecin.