Nom du patient _____

Date de 1ère prescription du tériflunomide ____ / ____ / _____

Nom du centre _____

Nom du médecin traitant _____

Nom du neurologue _____

Quels sont les médicaments contenant du tériflunomide ?
Il s'agit des médicaments suivants : AUBAGIO® 7 mg, comprimé pelliculé / AUBAGIO® 14 mg, comprimé pelliculé ou un médicament générique.
Le nom du médicament délivré par votre pharmacien ou prescrit par votre médecin est alors celui de la substance active suivie du nom du laboratoire et du dosage.
Pour plus d'information, lisez attentivement la notice disponible sur la base de données publique des médicaments ou directement sur le site internet : **https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr**.
Contactez votre médecin si vous avez des questions ou si vous présentez un effet indésirable.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé **https://signalement.social-sante.gouv.fr**.
Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : **https://ansm.sante.fr**.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

7000043816 - 09/2023

CARTE PATIENT

Version 7 - Septembre 2023
Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

Cette **CARTE PATIENT** contient des informations importantes que vous devez connaître concernant votre traitement par tériflunomide.

GÉNÉRALITÉS

Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge (en particulier en cas d'urgence médicale).



EFFETS INDÉSIRABLES IMPORTANTS

Ce médicament peut affecter votre fonction hépatique et certaines cellules sanguines importantes pour combattre les infections.

Veuillez contacter immédiatement votre médecin si vous présentez un des effets indésirables suivants :

- ✔ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux, urines foncées, nausées ou vomissements et douleur abdominale. Vous pourriez présenter un problème hépatique.
- ✔ Température élevée (fièvre), toux, frissons, gonflement des ganglions, débit urinaire réduit ou mictions douloureuses. Vous pourriez avoir une infection.



INFORMATION À DESTINATION DES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER, Y COMPRIS LES JEUNES FILLES, LEURS PARENTS/SOIGNANTS : GROSSESSE ET ALLAITEMENT

✔ Ne débutez pas un traitement par tériflunomide si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. Votre médecin pourra vous demander d'effectuer un test de grossesse pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte, avant de débuter le traitement.

- ✔ Vous devez utiliser un moyen de contraception efficace pendant et après le traitement par tériflunomide, jusqu'à ce que la quantité de tériflunomide dans votre sang soit suffisamment basse (ce qui sera vérifié par votre médecin). Un rappel de prise de contraceptif oral peut être utilisé à l'aide d'une application sur smartphones / tablettes. Votre médecin vous informera sur les potentiels risques pour le fœtus et sur la nécessité d'une contraception efficace.
- ✔ Contactez votre médecin si vous souhaitez changer de méthode de contraception ou si vous avez un désir de grossesse.
- ✔ Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, arrêtez votre traitement par le tériflunomide et contactez immédiatement votre médecin.
- ✔ Si vous découvrez que vous êtes enceinte, votre médecin pourra envisager un traitement spécifique visant à éliminer rapidement et efficacement le tériflunomide de votre organisme.
- ✔ Vous devez également informer votre médecin si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter car le tériflunomide passe dans le lait maternel : vous ne devez pas allaiter pendant le traitement.
- ✔ Pour les parents/soignants ou les jeunes filles : veuillez contacter votre médecin lorsque la patiente a ses règles pour la première fois afin d'obtenir des informations sur la nécessité d'une contraception efficace compte-tenu des risques potentiels pour le foetus en cas de grossesse.