



à retrouver sur [www.addictovigilance.fr/oppidum](http://www.addictovigilance.fr/oppidum)

# Les principaux FAITS MARQUANTS 2017



## PRESENTATION DU PROGRAMME

OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) est un dispositif de pharmacosurveillance et de veille sanitaire sur les substances psychoactives (SPA) du Réseau Français d'Addictovigilance [1]

Il repose sur des enquêtes transversales, nationales et multicentriques, menées chaque année au mois d'octobre. Il recueille, sur l'ensemble du territoire, grâce à une collaboration de proximité avec les structures spécialisées dans les addictions, des informations sur les modalités de consommation des SPA prises la semaine précédant l'enquête par les patients présentant un abus, une dépendance, ou sous MSO

En 2017, 232 structures ont participé contribuant à des informations sur 5 370 sujets, décrivant 11 054 modalités de consommations de SPA (dont 58% de médicaments)

## DIVERSIFICATION DES PRODUITS

- ❑ 4,7 % des sujets ont consommé au moins un produit de synthèse (N=308 produits de synthèse)
  - ➔ Consommation MDMA et LSD
  - 17 % sont des nouveaux produits de synthèse (NPS) :  
Principalement des cathinones (3-MMC, MDPV, Méphédronne, 4-MEC, alpha-PVP, penthédronne, N-éthyl-penthédronne, 3-MEC, MDPHP) et méthamphétamine (en augmentation)
- ❑ 1ers signalements de consommation : « chimique », krokodil, cannabidiol
- ❑ ➔ Consommation de GHB/GBL et de poppers



### FOCUS : Cathinones

- 2 fois plus de consommateurs de cathinones
- Importante utilisation par voie IV (55%)
- 50% des sujets présentent une dépendance
- Largement utilisées dans des contextes de Chemsex et de SLAM, souvent associées au GHB/GBL, à la méthamphétamine, à la cocaïne et plus rarement à la kétamine [2]

## VOIES D'ADMINISTRATION DES PRODUITS

- ❑ 10 % des sujets ont consommé des SPA par voie IV
  - 42 % sont des médicaments
  - Les principales SPA injectées : cocaïne (36%), buprénorphine (18%), héroïne (17%), morphine (15%)
  - L'injection concerne aussi d'autres médicaments comme méthylphénidate, oxycodone, méthadone, zolpidem
- ❑ 22 % des sujets ont consommé des SPA par voie nasale (vs 20% en 2016, 16% en 2015)
  - 15 % sont des médicaments (principalement buprénorphine)
  - Les principales SPA sniffées : cocaïne (42%), héroïne (36%)
- ❑ 11% des sujets ont consommé des SPA par voie inhalée (hors cannabis) (vs 10% en 2016, 7% en 2015)
  - 4,5% sont des médicaments (principalement buprénorphine)
  - Les principales SPA inhalées : cocaïne (59%), héroïne (19%), crack (13%)



### FOCUS :

En 2017, nette augmentation de la proportion des sujets ayant consommé par voie nasale

## AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DE COCAÏNE

- 20% des sujets ont consommé de la cocaïne (vs 16% en 2016 vs 11% en 2015) et 1,6% des sujets ont consommé du crack
- 58% ont consommée la cocaïne par voie nasale, 37% par voie inhalée « freebase » (niveau le plus haut) et 25% par voie IV
- 23% de consommation quotidienne (vs 14% en 2016)
- 44% de prise concomitante d'alcool
- 37% sont dépendants (vs 30% en 2016)




### FOCUS :

- Cocaïne + Alcool = formation d'un métabolite actif : le cocaéthylène (demi-vie d'élimination 3 fois supérieure à celle de la cocaïne) qui a une action proche de la cocaïne (blocage des transporteurs présynaptiques des monoamines et essentiellement de la dopamine). A l'origine d'une potentialisation des effets cardiovasculaires et augmentation du risque de mort subite [3]
- Selon l'étude DRAMES [4] : augmentation du nombre de décès en lien avec l'usage de cocaïne à partir de 2014 (25 cas en 2010 et 44 cas en 2015)

## FOCUS DES DONNÉES ISSUES DES SUJETS DES CAARUD et CSAPA

- Consommation de SPA par voie IV plus importante chez les sujets vus en CAARUD




## Les MSO (protocole médical global) : 69% des sujets

- 67% sous Méthadone
- 28% sous Buprénorphine
- 4% sous Buprénorphine/naloxone
- 1% sous autre médicament

### Méthadone sous protocole (97,5%) : 55% sous gélule

- Augmentation de l'obtention illégale de méthadone



- La part de consommation associée d'héroïne et de cocaïne est la + élevée depuis 2008 chez les consommateurs de méthadone :


- ✓ Héroïne (24% de consommateurs de la forme sirop et 16% de la forme gélule)
- ✓ Cocaïne (24% de consommateurs de la forme sirop et 17% de la forme gélule)

### Buprénorphine sous protocole (94%) : 32% sous génériques

- Mésusage plus fréquent pour le princeps que pour les génériques :

- ✓ Obtention illégale : 14% versus 9%
- ✓ Voie IV : 16% versus 4%
- ✓ Voie nasale : 13% versus 8%

## AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DES ANALGESIQUES OPIOIDES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES



### ! FOCUS TRAMADOL

Les motifs d'usages sont multiples : récréatif, recherche d'effet hypnotique, conduite dopante, automédication à visée antidépressive ou anxiolytique. Dans un contexte d'abus, le tramadol peut être responsable de crises convulsives et de décès [5]

Pour rappel : le tramadol est un agoniste des récepteurs  $\mu$  opioïdes, mais aussi un inhibiteur de recapture de noradrénaline et sérotonine

### ! FOCUS OXYCODONE

C'est un opioïde semi-synthétique, agoniste  $\mu$ ,  $\delta$  et  $\kappa$  dont la puissance analgésique est deux fois supérieure à celle de la morphine. On observe une augmentation de son mésusage en France [6]

### ! FOCUS METHADONE

En raison des spécificités pharmacologiques de la méthadone, son maniement est complexe avec un risque d'overdose opiacés pouvant nécessiter de réitérer les doses de naloxone [7]

#### REFERENCES

- Frauger et al. Dispositif pharmacoépidémiologique de surveillance des substances psychoactives : intérêts du programme national OPIIDUM du Réseau français d'addictovigilance. *Thérapie*. 2017;72(4):491-501.
- Batisse et al. Usage de psychostimulants dans un contexte sexuel : analyse des cas rapportés au Réseau français des centres d'addictovigilance. Évaluation des risques liés à la pratique du SLAM. *Thérapie*. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.therap.2016.04.003>
- Cocaine et alcool : un usage concomitant potentiellement dangereux : BIP31.FR Octobre 2017 CHU Toulouse
- Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances : Principaux résultats enquête DRAMES 2015 <http://www.addictovigilance.fr>
- Roussin et al. Un exemple d'évaluation de l'abus et de la dépendance en addictovigilance : à propos du tramadol. *Thérapie* 2015 Mars-Avril; 70 (2): 203-211
- Lapyere-Mestre. Rapport national d'Addictovigilance <http://www.addictovigilance.fr>
- Soyons plus que jamais vigilants avec la Méthadone : Apport des données d'Addictovigilance. Bulletin d'addictovigilance <http://www.addictovigilance.fr>

REMERCIEMENTS: Aux structures ayant participé en 2017 : nous espérons vous associer à l'enquête oppidum n°30, du 1er au 28 octobre 2018

Document réalisé avec le soutien de l'ANSM

CENTRE D'ADDICTOVIGILANCE PACA-Corse

Service de Pharmacologie Clinique, Hôpital la Timone, CHU de Marseille – Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille

264 rue Saint Pierre – 13385 Marseille cedex 5 ☎ +33(0).491.38.42.37 ✉ [addictovigilance@ap-hm.fr](mailto:addictovigilance@ap-hm.fr)