

**Direction de l'Evaluation
des Médicaments et des Produits Biologiques**

Rapport public d'évaluation

***LERCANIDIPINE EG 20 mg,
comprimé pelliculé sécable***

LERCANIDIPINE (CHLORHYDRATE DE)

Titulaire d'AMM : EG LABO – Laboratoires EuroGénériques

Date du RAPPE : 12 juillet 2010

Information sur la procédure initiale :

| | |
|-----------------------------|--|
| Base légale | <i>Générique selon l'Article 10.1 de la directive 2001/83/CE</i> |
| Principe(s) actif(s) | <i>lercanidipine (chlorhydrate de)</i> |
| Forme pharmaceutique | <i>comprimé pelliculé sécable</i> |
| Dosage (s) | <i>20 mg</i> |
| Demandeur d'AMM : | <i>EG LABO – Laboratoires EuroGénériques</i> |
| Type de procédure | <i>Nationale</i> |

1. INTRODUCTION

Le 12 janvier 2010, l'AFSSAPS a octroyé une Autorisation de Mise sur le Marché à EG LABO – Laboratoires EuroGénériques pour la spécialité LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable est un générique de ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé commercialisé en France par BOUCHARA RECORDATI.

Le demandeur d'AMM a soumis une étude de bioéquivalence. La spécialité de référence utilisée dans l'étude de bioéquivalence est CORIFEO 20 mg, comprimé commercialisée par UCB GmbH en Allemagne de formule identique à la référence française.

Aucune nouvelle étude préclinique ou clinique n'a été apportée, ce qui est acceptable pour ce type de demande.

2. DONNEES PHARMACEUTIQUES

2.1 Introduction

LERCANIDIPINE EG 20 mg se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable contenant 20 mg de lercanidipine (chlorhydrate de).

Les excipients sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, povidone, stéarate de magnésium.

Pelliculage : OPADRY II Rose 85F34564 (alcool polyvinylique hydrolysé, dioxyde de titane (E171), macrogol, talc, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172).

LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable est conditionné sous :

. plaquettes thermoformées (Aluminium/PVC).

. plaquettes thermoformées (Aluminium/PVDC).

2.2 Principe actif

Le principe actif lercanidipine (chlorhydrate de) n'est pas décrit à la Pharmacopée européenne et la procédure "ASMF" (documentation confidentielle sur la substance active) est utilisée.

Le principe actif lercanidipine (chlorhydrate de) est peu soluble dans l'eau.

Les spécifications comprennent des essais appropriés pour contrôler la qualité du principe actif. Les limites pour les substances apparentées sont justifiées. Les méthodes analytiques utilisées sont convenablement décrites et validées.

Les études de stabilité ont été conduites en conditions ICH (Conférence Internationale d'Harmonisation). Les données présentées sont suffisantes pour confirmer la période de recontrôle.

2.3 Produit fini

LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable est formulé avec des excipients décrits dans la Pharmacopée européenne en vigueur à l'exception de l'oxyde de fer jaune (E172) et l'oxyde de fer rouge (E172).

Tous les excipients utilisés dans le produit ont été démontrés conformes à la Directive 2003/63/EC et à la note explicative « Réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire (EMEA/410/01). »

Le développement est suffisamment décrit en accord avec les notes explicatives européennes en vigueur.

La comparaison du profil de dissolution in-vitro et du profil d'impuretés du produit générique et du produit de référence confirme la similarité entre les deux spécialités.

Le procédé de fabrication est suffisamment décrit et les étapes critiques identifiées.

Les résultats des études de validation du procédé confirment que le procédé est contrôlé et garantissent la reproductibilité inter lot et la conformité aux spécifications.

Les essais réalisés et les spécifications fixées sont appropriés pour contrôler la qualité du produit fini et la sécurité de son utilisation.

Les études de stabilité ont été conduites en conditions ICH. Les données présentées confirment la durée de conservation indiquée dans le RCP : 2 ans à conserver à une température ne dépassant pas 25°C, pour les plaquettes thermoformées Alu/PVC et Alu/PVDC.

3. DONNEES TOXICOLOGIQUES

Etant donné que ce produit est un générique et qu'il fait référence à un produit approuvé sur la base d'un dossier complet concernant les études précliniques, de nouvelles données précliniques n'ont pas été soumises et ne sont pas considérées nécessaires.

4. DONNEES CLINIQUES

Au plan biopharmaceutique :

Un essai de bioéquivalence réalisé avec le comprimé 20 mg est fourni à l'appui de cette demande.

Bref descriptif de l'essai :

- L'essai fourni à été réalisé en 2007.*
- Le schéma expérimental est ouvert, croisé et randomisé à 4 périodes.*
- Dose unique de 20 mg à jeun.*
- Monitoring des concentrations plasmatiques pendant 48 heures et une période de wash-out d'une semaine entre les séquences de traitement.*

- 34 volontaires sains ont été inclus dont 27 ont fini l'étude et ont été analysés.

Les produits comparés :

Produit test :

Comprimés LERCANIDIPINE à 20 mg. Ces comprimés sont issus du lot n° D30648 dont la taille est de 100.000 comprimés.

Produit de référence :

Comprimés CORIFEO 20 mg, commercialisés par UCB GmbH en Allemagne (lot n° M06A07) de formule identique à la spécialité de référence commercialisée en France.

Analytique :

La méthode de dosage de la Lercanidipine, CLHP chirale avec détection MS-MS est correctement décrite et validée.

Les résultats :

Les résultats de cet essai, qui portent sur les moyennes des AUC_{0-t} (aire sous la courbe de la concentration plasmatique de l'administration à la dernière valeur observée à l'instant t), des AUC_{0-∞} (aire sous la courbe de la concentration plasmatique extrapolée à l'infini) et des C_{max} (concentration plasmatique maximale) sont compris dans l'intervalle de confiance d'acceptation de [0,80 - 1,25].

Conclusion :

La bioéquivalence est démontrée entre la spécialité LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable et la spécialité de référence utilisée, de formule identique à la spécialité de référence française.

5. CONCLUSION

La qualité pharmaceutique de LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable a été démontrée suffisante et reproductible.

La bioéquivalence a été démontrée conformément aux exigences européennes.

LERCANIDIPINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable est générique de ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé qui est une spécialité connue avec un rapport bénéfice risque favorable. Le RCP est en accord avec celui du produit de référence.